

## 【肺がん(外来)】

最終更新令和4年8月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名:数量 投与日	嚥吐性 リスク
1 lun001	肺-内;AMR(40mg/mi)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3 (繁) カルセド注(規格なし):40mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3	中等度
2 lun002	肺-内;DTX(60mg/mi)療法【3週毎】	トセキセル60mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 トセキセル点滴静注液(プロ) (規格なし):60mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3 lun003	肺-内;CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 ファモチジン静注 2.0mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:6A Day1 パクリタキセル静注液(社):2 (規格なし):200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加替アザン点滴静注液[日医工](規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
4 lun004	肺-内;CBDCA+CPT-11療法【4週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 イリスカ塩酸塩点滴静注液[トワ]:60mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 加替アザン点滴静注液[日医工](規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
5 lun005	肺-内;CBDCA+VP-16療法【4週毎】	CBDCA;AUC5	ソリアセトD輸液 500mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3 エトボンド点滴静注液100mg[サト]:100mg/5mL/V:100mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加替アザン点滴静注液[日医工](規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
6 lun006	肺-内;CBDCA+GEM療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタビン点滴静注用「NJK」(規格なし):1000mg/mi Day1 Day8 生食注 1000mL(針なし):1本 Day1 Day8 加替アザン点滴静注液[日医工](規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
7 lun007	肺-内;CBDCA+PEM療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 1000mL(針なし):1本 Day1 加替アザン点滴静注液[日医工](規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
8 lun008	肺-内;Bmab+ CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:6A Day1 ファモチジン静注 2.0mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル注液(社):2 (規格なし):200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アバズチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 1000mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
9 lun009	肺-内;CBDCA(AUC2)+PTX(40mg/mi)+RT療法【毎週】	CBDCA;AUC2【放射線併用】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 ファモチジン静注 2.0mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 パクリタキセル注液(社):2 (規格なし):40mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 加替アザン点滴静注液[日医工](規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度

10	lun010	肺-内;CBDCA+S-1療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HKJ〕:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 加味アラキシ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度 (特定)
11	lun011	肺-内;CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HKJ〕:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊)アラキシ点滴静注用100mg(特生物):100mg/ml Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加味アラキシ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
12	lun012	肺-内;PEM療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	軽度
13	lun013	肺-内;PEM+CBDCA+Bmab療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HKJ〕:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 加味アラキシ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバチシ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
14	lun014	肺-内;PEM+Bmab療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 アバチシ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	軽度
15	lun015	肺-内;Bmab療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバチシ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
16	lun016	肺-内;CDDP+CPT-11療法【3週毎】	小細胞肺癌…IP療法のday8,15のCPT-11単独投与【2投1休】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HKJ〕:1本 Day1 Day8 デキサート注射液3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 リハガ塩酸塩点滴静注液「トリ」(規格なし):60mg/ml Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8	高度
17	lun021	肺-内;ニキハマツ療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブシーポ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
18	lun022	肺-内;NGT療法【3週毎】	小細胞肺癌	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3 (緊)ハイカムチン注射用1.1mg:1mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	軽度

19	lun023	肺-内;RAM+DTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (繁)サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 ドセザル点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
20	lun024	肺-内;^ム^叫スマ^療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繁)キトローダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
21	lun025	肺-内;^ム^叫スマ^+CBDCA+PEM療法【3週毎】	day1: ^ム^叫スマ^ (200mg/body) 、加味^ヨウ (AUC5) 、アリム (500mg/ml) ※4コース後、維持療法	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(パック1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 (繁)キトローダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 アリム注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 加味^ヨウ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖250mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
22	lun026	肺-内;^ム^叫スマ^+PEM療法【3週毎】	【維持療法】day1: ^ム^叫スマ^ (200mg/body) 、アリム (500mg/ml) ※^ム^は導入療法と合わせて計35回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (繁)キトローダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 アリム注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	軽度
23	lun027	肺-内;^ム^叫スマ^+CBDCA+PTX療法【3週毎】	[扁平](day1)^ム^叫スマ^:200mg/body,PTX:200mg/ml,CBDCa:AUC6※最大4J-3→維持療法(計35回)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(パック1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 ファモチジン静注 20mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 (繁)キトローダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 バクリタキセル注(後発品社名:規格なし):200mg/ml Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加味^ヨウ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖250mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
24	lun028	肺-内;^ム^叫スマ^+CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	[扁平]^ム^:200mg/body(day1),nab-PTX:100mg/ml(day1,8,15),CBDCa(AUC6)(day1)※最大4J-3→維持療法(計35回)	生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 グニセトロン点滴静注(パック1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (繁)アブラサン点滴静注用100mg(特生物):100mg/ml Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加味^ヨウ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖250mL/B:1本 Day1 (繁)キトローダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	中等度(特定)
25	lun029	肺-内;アツリマ^療法【3週毎】	アツリマ^ 1200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繁)テセトリック点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
26	lun030	肺-内;アツリマ^+Bmab+CBDCA+PTX療法【3週毎】	[非扁平](day1)アツリマ^:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,PTX:175mg/ml,CBDCa:AUC6※最大4J-3→維持療法(計35回)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(パック1mg/50mL)[HK]:1本 Day1 ファモチジン静注 20mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 (繁)テセトリック点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバチシム点滴静注液(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 バクリタキセル注(社名:規格なし):175mg/ml Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加味^ヨウ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度(特定)
27	lun031	肺-内;アツリマ^+Bmab療法【3週毎】	[非扁平](day1)アツリマ^:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,※導入療法4-6J-3後の維持療法	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繁)テセトリック点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバチシム点滴静注液(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度

28	lun032	肺-内;アソリマツ+CBDCA+VP-16療法【3週毎】	<p>【ED-SCLC】(day1)アソリマツ:1200mg/body,CBDCa:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/mi※4J-ス→維持療法へ</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グニセトロ点滴静注(ワグ1mg/50mL)HKJ:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 (繁) テセントリク点滴静注1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 エボシド点滴静注液100mg「リト」 100mg/5mL/V:100mg/mi Day1 Day2 Day3 加味アソリマツ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3</p>	中等度(特定)
29	lun033	肺-内;アソリマツ療法【2週毎】	<p>【地固め療法】デュルバリマブ (day1) 10mg/kg ※投与期間は、初回投与から12ヶ月間まで</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミフィンジ注(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
30	lun034	肺-内;アソリマツ+CBDCA+VP-16療法【3週毎】	<p>【ED-SCLC】(day1)アソリマツ:1500mg/body,CBDCa:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/mi※4J-ス→維持療法へ</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グニセトロ点滴静注(ワグ1mg/50mL)HKJ:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 エボシド点滴静注液100mg「リト」 100mg/5mL/V:100mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加味アソリマツ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3</p>	中等度(特定)
31	lun035	肺-内;アソリマツ 1500療法【4週毎】	<p>【維持療法】アソリマツ+CBDCA+VP-16【3週毎】4J-ス後に実施。※PDまで</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1</p>	最小度
32	lun036	肺-呼外;アソリマツ 400療法【6週毎】	<p>アソリマツ 400mg/body</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繁) キイトルーア点滴静注 100mg/4mL/V:400mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	最小度
33	lun037	肺-内;RAM+EGFR-TKI療法【2週毎】	<p>RAM 10mg/kg,EGFR-TKI(各々の添付文書どおり)※PDまで</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繁) サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1</p>	最小度
34	lun040	肺-内;ニボリマツ+化リムマツ療法【6週毎】	<p>【NSCLC】【悪性中皮腫】day1,22ニボリマツ 360mg/body,day1化リムマツ 1mg/kg※PDまで、ニボリマツ、化リムマツは最長2年間まで投与可</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day22 (繁) ヤボイ点滴静注 50mg/10mL/V:1mg/kg Day1 生食注 50mL(針なし):30ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 オブジーポ注(規格なし):360mg Day1 Day22 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day22</p>	最小度
35	lun041	肺-内;ニボリマツ 480療法【4週毎】	<p>(day1)ニボリマツ 480mg※PDまで</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーポ注(規格なし):480mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	最小度

36	lun043	肺-内;(short) ネシムマフ <sup>®</sup> +CDDP+GEM療法【3週毎】	<p>【扁平】※最大4J→維持療法(ネシムマフ<sup>®</sup>単独)へ ★年齢、PS、腎機能、心機能、1L/日以上の飲水可能を確認。</p> <p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8            (繫) ポートラーザ点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8            生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8            生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8            バロセト点滴静注液 0.75mg/50mL「タブ」(アセチル):1本 Day1            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day8            生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8            ゲムシタピン点滴静注用「NK」(規格なし):1250mg/ml Day1 Day8            生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8            ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1            硫酸Mg補正液 1mEq/ml:8ml Day1            シスプラチン注 「日医工」(規格なし) (後発品):75mg/ml Day1            生食注 500mL/袋 (点滴用):1本 Day1            フロセミド注「トーワ」2.0mg/2mL/A:1A Day1            20%マニネットール注射液「YD」300mL:1袋 Day1            KN 3号輸液 500mL:1袋 Day1         </p>	高度
37	lun044	肺-内;ネシムマフ <sup>®</sup> 維持療法【3週毎】	<p>※ネシムマフ<sup>®</sup> + CDDP+GEM療法4J→後の維持療法、PDまで</p> <p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8            (繫) ポートラーザ点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8            生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8            生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8</p>	最小度