

## 【血液腫瘍(外来)】

最終更新令和4年8月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報	催吐性リスク
			薬品名:数量 投与日	
1 blo001	血液-内;MDS/AML_アザシジン(ビダーザ)皮下療法	5-2-2【28日間】※PDまで 制吐剤としてアザシジン投与前にナセ70.1mg錠を服用 【MDS】 他の抗悪性腫瘍剤との併用は、有効性及び安全性は確立していない。 【AML】ベネトクラクスとの併用療法の場合 ＊ベネトクラクス(ベネクリクス)1日1回食後の連日投与	(聚) ビダーザ注射用 1 0 0 m g :75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用水フロー20m L:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9	中等度
2 blo002	血液-内;ATO_療法(寛解導入後)【25回】	三酸化二砒素0.15mg/kg,5週間の間に1日1回計25回	生食250mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 トリセタックス注10mg 10mg/10mL/A 0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	中等度であるが、制吐剤なしで対応
3 blo024	血液-内;NHL_R-THP-COP療法【3週毎】	※最大8J-まで アドニンをday3-7に服用	生食注 5 0 0 m L /袋 (点滴用):1本 Day1 ソル-コーテ注射用100mg/V (溶解液付):1V Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし):1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塩生食注 (規格なし):337.5mL/m <sup>2</sup> Day1 生食注 5 0 0 m L /袋 (点滴用):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注(ワグ1mg/50mL/HKJ):1本 Day3 オングリ注 1 mg/V:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 2 0 m L / A:1A Day3 ビノルビン注射用(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day3 5%ブドウ糖注 1 0 0 m L / B:1本 Day1 エンドサイン注(規格なし):750mg/m <sup>2</sup> Day3 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day3	高度
4 blo025	血液-内;NHL_THP-COP療法【3週毎】	※最大8J-まで アドニンをday1-5に服用	生食注 5 0 0 m L /袋 (点滴用):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注(ワグ1mg/50mL/HKJ):1本 Day1 オングリ注 1 mg/V:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 2 0 m L / A:1A Day1 ビノルビン注射用(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 m L / B:1本 Day1 エンドサイン注(規格なし):750mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1	高度
5 blo026	血液-内;NHL_RB療法【4週毎】	day1リキマツ 375mg/m <sup>2</sup> day2,3^+ガムスチ90mg/m <sup>2</sup> 【4週毎】	生食注 5 0 0 m L /袋 (点滴用):1本 Day1 ソル-コーテ注射用100mg/V (溶解液付):1V Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし):1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塩生食注 (規格なし):337.5mL/m <sup>2</sup> Day1 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注(ワグ1mg/50mL/HKJ):1本 Day2 Day3 デキサート注射液3...3 mg /mL/A:3A Day2 Day3 トレアキシン点滴静注液100mg/4ml:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day2 Day3	中等度
6 blo028	血液-内;HL_ABVD療法	THP25mg/m <sup>2</sup> +BLM10mg/m <sup>2</sup> +VBL6mg/m <sup>2</sup> +DTIC375mg/m <sup>2</sup>	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 デキサート注射液3...3 mg /mL/A:3A Day1 パリセトムol点滴静注*カゼ0.75mg/50ml[940J] (アセト後発):1本 Day1 ビノルビン注射用(規格なし):25mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 m L / B:1本 Day1 (聚) ブオ注射用1.5 mg:10mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 2 0 m L / A:1A Day1 エクザール注 1 0 mg/V:6mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 2 0 m L / A:1A Day1 (口座) タカルバジン注用 1 0 0 mg/V:375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塩蒸留水100m L:1本 Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m L /B:1本 Day1	高度
7 blo032	血液-内;ATLL_ホリマツ(ホテリジオ)療法【毎週】	ホリマツ 1mg/kg	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 ソル-コーテ注射用100mg/V (溶解液付):1V Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし):1本 Day1 (聚) ホテリジオ点滴静注 2 0 m g:1mg/kg Day1 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1	-
8 blo036	血液-内;HL/ALCL_ブレンキマツ ハドカ療法【3週毎】	再発又は難治性のCD30陽性【目標最大16J-】	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 デキサート注射液3...3 mg /mL/A:2A Day1 生食注 5 0 m L (針なし):1本 Day1 (聚) アドセトリス点滴静注用「カザ」 5 0 mg/V:1.8mg/kg Day1 大塩蒸留水100m L:1本 Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし):1本 Day1	-
9 blo038	血液-内;古典的HL_ホルマツ療法【2週毎】	ホルマツ 240mg/body	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 オブジボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし):1本 Day1	最小度

10	blo039	<b>血液-内;NHL_リツシマフ維持療法【8週毎】</b>	リツキシマブ375mg/m2,(8週毎),最大12クール	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg/V(溶解液付):1V Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 リツキシマフ注(規格なし):375mg/m Day1 大塚生食注(規格なし):337.5ml/m Day1	最小度
11	blo040	<b>血液-内;PTCL_ロミテフシン(イストダーグク)療法【4週毎】</b>	ロミテフシン day1,8,15 : 14mg/m 電解質(K,Mg,Ca等)、B肝ウイルス、CD4陽性Tリンパ球、アルコール過敏等確認	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL/HKJ:1本 Day1 Day8 Day15 (緊)イストダーグク点滴静注10mg:14mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15	-
12	blo044	<b>血液-内;FL_[2-6]-7目】GB療法【4週毎】</b>	カザイハ 1000mg/body (day1) ハンタムスチン 90mg/m2 (day2,3) ※64kg ※アワリリムは避ける	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)ガザイハ点滴静注 1000mg:1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL/HKJ:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:3A Day2 Day3 トレアシム点滴静注液100mg/4ml:90mg/m Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
13	blo045	<b>血液-内;FL_北ヨツシマフ(カザイハ)維持療法【8週毎】</b>	カザイハ (day1) ※最大2年間	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ガザイハ点滴静注 1000mg:1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1	-
14	blo054	<b>血液-内;HL_A-AVD療法【2週毎】</b>	未治療のCD30陽性HL【最大12コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アドセトロ点滴静注/カ 0.75mg/50mL/HKJ (アホ後発):1本 Day1 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:3A Day1 ビノルビン注射用(規格なし):25mg/m Day1 5%アブド糖注 1000mL/B:1本 Day1 エクザーブ注 100mg/V:6mg/m Day1 生食注 2.0mL/A:1A Day1 (口座)タカルバジン注用 1000mg:375mg/m Day1 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 5%アブド糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 (緊)アドセトロ点滴静注用「カ」 50mg/V:1.2mg/kg Day1 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 生食注 1000mL(針なし):1本 Day1	高度
15	blo055	<b>血液-内;PTCL_A-THP-CP療法【3週毎】</b>	未治療のCD30陽性PTCL【最大8コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL/HKJ:1本 Day1 ビノルビン注射用(規格なし):50mg/m Day1 5%アブド糖注 1000mL/B:1本 Day1 エンドセサン注(規格なし):750mg/m Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 (緊)アドセトロ点滴静注用「カ」 50mg/V:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 生食注 1000mL(針なし):1本 Day1	-
16	blo056	<b>血液-内;NHL_VR-THP-CP療法【3週毎】</b>	【最大8コース】	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg/V(溶解液付):1V Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 リツキシマフ注(規格なし):375mg/m Day1 大塚生食注(規格なし):337.5ml/m Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day2 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL/HKJ:1本 Day2 ペルケイド注射用3mg/m Day2 Day5 Day9 Day12 生食注 2.0mL/A:1A Day2 Day5 Day9 Day12 ビノルビン注射用(規格なし):50mg/m Day2 5%アブド糖注 1000mL/B:1本 Day2 エンドセサン注(規格なし):750mg/m Day2 生食注 250mL/袋:1袋 Day2	-
17	blo058	<b>血液-内;MM_ホルモジン(ハルヒド)皮下療法(週1回)</b>	4投1休【5週間】	ペルケイド注射用3mg:1.3mg/m Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2.0mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
18	blo060	<b>血液-内;MM_[2-12]-7目】KRd療法【4週毎】</b>	カルチリジン 27mg/m(Day1,2,8,9,15,16)※最大2.2mまで※Ccrが15mL/min未満で休業 DEX(Day1,2,8,9,15,16,22),レブラミド(day1-21)	5%アブド糖注 250mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:10A Day1 Day8 Day15 生食注 1000mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:1A Day2 Day9 Day16 生食注 1000mL(針なし):1本 Day2 Day9 Day16 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (緊)カイプロス点滴静注(規格なし):27mg/m Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%アブド糖注 1000mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-

19	blo061	血液-内;MM_[13]- <sup>7</sup> 目以降]KRd療法[4週毎]	カルチルミジン 27mg/m(Day1,2,15,16) ※最大2.2mまで ※Ccrが15mL/分未満で休業 DEX(Day1,2,8,,15,16,22),レブラミド(day1-21)	5%ブドウ糖注 2 5 0 mL/B:1本 Day1 Day2 Day15 Day16 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:10A Day1 Day15 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:1A Day2 Day16 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day2 Day16 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day15 Day16 (繋) カイプロス点滴静注用 (規格なし) :27mg/ml Day1 Day2 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day2 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL /B:1本 Day1 Day2 Day15 Day16	-
20	blo063	血液-内;MM_[2]- <sup>7</sup> 目以降]Kd療法[4週毎]	カルチルミジン 56mg/m (Day1、2、8、9、15、16) ※最大2.2mまで ※Ccrが15mL/分未満で休業	5%ブドウ糖注 2 5 0 mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:6A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (繋) カイプロス点滴静注用 (規格なし) :56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL /B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
21	blo065	血液-内;MM_[2]- <sup>7</sup> 目以降]Kd療法(週1回)[4週毎]	カルチルミジン 70mg/m (Day1、8、15) ※最大2.2mまで ※Ccrが15mL/分未満で休業	5%ブドウ糖注 2 5 0 mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:10A Day1 Day8 Day15 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (繋) カイプロス点滴静注用 (規格なし) :70mg/ml Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL /B:1本 Day1 Day8 Day15	-
22	blo067	血液-内;MM_[2]- <sup>7</sup> 目]ELd療法[4週毎]	エロツスマブ10mg/ kg (Day1,8,15,22),DEX(Day1,8,15,22),レブラミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 (繋) エムブリシティ点滴静注用 (規格なし) :10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 5 0 mL /袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-
23	blo068	血液-内;MM_[3]- <sup>7</sup> 目以降]ELd療法[4週毎]	エロツスマブ10mg/ kg (Day1,15),DEX(Day1,15),レブラミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL /袋:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:2A Day1 Day15 (繋) エムブリシティ点滴静注用 (規格なし) :10mg/kg Day1 Day15 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day15 生食注 2 5 0 mL /袋:230ml Day1 Day15	-
24	blo069	血液-内;MM_[1-2]- <sup>7</sup> 目]EPd療法 [4週毎]	エロツスマブ10mg/kg/day (day1,8,15,22) ,デキサメタゾン (day1,8,15,22) ,ボマリドミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 (繋) エムブリシティ点滴静注用 (規格なし) :10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 5 0 mL /袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-
25	blo070	血液-内;MM_[3]- <sup>7</sup> 目以降]EPd療法[4週毎]	エロツスマブ20mg/kg/day (day1) ,デキサメタゾン (day1,8,15,22) ,ボマリドミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL /袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg /mL/A:2A Day1 (繋) エムブリシティ点滴静注用 (規格なし) :20mg/kg Day1 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 生食注 2 5 0 mL /袋:210ml Day1	-
26	blo072	血液-内;MM_[2-3]- <sup>7</sup> 目]DBd療法[3週毎]	カルチムマブ 16mg/kg,day1,8,15,カルチムマブ 1.3mg/m2day1,4,8,11,カルチムマブ 80mg/week	ペルケイド注射用 3 mg :1.3mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 m L / A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 5 0 mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラセックス点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 0 mL /袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15	-
27	blo073	血液-内;MM_[4-8]- <sup>7</sup> 目]DBd療法[3週毎]	カルチムマブ 16mg/kg,day1,カルチムマブ 1.3mg/m2day1,4,8,11,カルチムマブ 80mg/week	ペルケイド注射用 3 mg :1.3mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 m L / A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 5 0 mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラセックス点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 0 mL /袋 (点滴用) :1本 Day1	-
28	blo074	血液-内;MM_[9]- <sup>7</sup> 目以降]DBd療法[4週毎]	カルチムマブ 16mg/kg,day1	生食注 2 5 0 mL /袋:1袋 Day1 グラセックス点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 5 0 0 mL /袋 (点滴用) :1本 Day1	-

29	blo075	<b>血液-内;MM_[1]-7目】DLd療法【4週毎】</b>	タラムマフ <sup>®</sup> 16mg/kg,day1,8,15,22,ケリトミト <sup>®</sup> 25mg,day1~21,テ <sup>®</sup> キメタリ <sup>®</sup> 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 グラセックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
30	blo076	<b>血液-内;MM_[2]-7目】DLd療法【4週毎】</b>	タラムマフ <sup>®</sup> 16mg/kg,day1,8,15,22,ケリトミト <sup>®</sup> 25mg,day1~21,テ <sup>®</sup> キメタリ <sup>®</sup> 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 グラセックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
31	blo077	<b>血液-内;MM_[3-6]-7目】DLd療法【4週毎】</b>	タラムマフ <sup>®</sup> 16mg/kg,day1,15,ケリトミト <sup>®</sup> 25mg,day1~21,テ <sup>®</sup> キメタリ <sup>®</sup> 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 グラセックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day15	-
32	blo078	<b>血液-内;MM_[7]-7目以降】DLd療法【4週毎】</b>	タラムマフ <sup>®</sup> 16mg/kg,day1,ケリトミト <sup>®</sup> 25mg,day1~21,テ <sup>®</sup> キメタリ <sup>®</sup> >40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1	-
33	blo079	<b>血液-内;キヤツスルン病_トリス<sup>®</sup> マフ(アケル)療法【2週毎】</b>	トリス <sup>®</sup> マフ (8mg/kg)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繁) アケムラ点滴静注用 (規格なし) :8mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	-
34	blo081	<b>内科.MM【2リケル目以降】IsaPd療法【28日毎】</b>	イサキマフ <sup>®</sup> 10mg/kg day1,15,テ <sup>®</sup> キメタリ <sup>®</sup> >40mg/day day1,8,15,22,ホ <sup>®</sup> マリ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> 4mg/m <sup>2</sup> day1-21	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液3. 3mg/mL/A:12A Day1 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day15 (繁) サークリクサ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15	-
35	blo083	<b>血液-内;MM_[2]-7目】DKd療法【4週毎】</b>	タラムマフ <sup>®</sup> 16mg/kg/day1,8,15,22,カムリ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> 56mg/m <sup>2</sup> day1,2,8,9,15,16,DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサート注射液3. 3mg/mL/A:6A Day2 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (繁) カイプロリス点滴静注用 (規格なし) :56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 グラセックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
36	blo084	<b>血液-内;MM_[3-6]-7目】DKd療法【4週毎】</b>	タラムマフ <sup>®</sup> 16mg/kg/day1,15,カムリ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> 56mg/m <sup>2</sup> day1,2,8,9,15,16,DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサート注射液3. 3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (繁) カイプロリス点滴静注用 (規格なし) :56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 グラセックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day15	-
37	blo085	<b>血液-内;MM_[7]-7目以降】DKd療法【4週毎】</b>	タラムマフ <sup>®</sup> 16mg/kg/day1,カムリ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> 56mg/m <sup>2</sup> day1,2,8,9,15,16,DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサート注射液3. 3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (繁) カイプロリス点滴静注用 (規格なし) :56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 グラセックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1	-

38	blo086	血液-内;CLL_リツキシマ(375mg/m)療法【4週毎】	リツキシマ 初回375mg/m→2回目以降500mg/m,最大投与回数6回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキサン注(規格なし):375mg/m Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5mg/m Day1	最小度
39	blo087	血液-内;CLL_リツキシマ(500mg/m)療法【4週毎】	リツキシマ 初回375mg/m→2回目以降500mg/m,最大投与回数6回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキサン注(規格なし):500mg/m Day1 大塚生食注 (規格なし) :450mg/m Day1	最小度
40	blo089	血液-内;MM_[2-3]-7目]scDBd療法【3週毎】	scガラムマ 1800mg/body day1,8,15,ホルテリミ 1.3mg/m day1,4,8,11, テキサメリ 80mg/week	ペルケイド注射用 3mg:1.3mg/m Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 (緊) ダラキユロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15	-
41	blo090	血液-内;MM_[4-8]-7目]scDBd療法【3週毎】	scガラムマ 1800mg/body day1,ホルテリミ 1.3mg/m day1,4,8,11, テキサメリ 80mg/week	ペルケイド注射用 3mg:1.3mg/m Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 (緊) ダラキユロ配合皮下注:1V Day1	-
42	blo091	血液-内;MM_[9]-7目以降]scDBd療法【4週毎】	scガラムマ 1800mg/body day1,テキサメリ/day1	(緊) ダラキユロ配合皮下注:1V Day1	-
43	blo092	血液-内;NHL_polaRB療法【4週毎】	(DLBCL) day1RIT375mg/m,day2リタブ1.8mg/kg,day2,3 リタブ90mg/m【4週毎】※最大6J-7	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day4 Day8 Day11 ソル・コーテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキシマ注(規格なし):375mg/m Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5mg/m Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注(ワグ1mg/50mL)HJK:1本 Day2 Day3 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:3A Day2 Day3 (緊) ホリビ点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day2 注射用水フロー20ml :1A Day2 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 トレアキシン点滴静注液100mg/4ml:90mg/m Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
44	blo094	血液-内;MM_[2]-7目]scDLd療法【4週毎】	scガラムマ 1800mg/body day1,8,15,22,レナリドミ 25mg,day1-21,DEX40mg/ week	(緊) ダラキユロ配合皮下注15ml/V:1V Day1 Day8 Day15 Day22	-
45	blo095	血液-内;MM_[3-6]-7目]scDLd療法【4週毎】	scガラムマ 1800mg/body day1,15,レナリドミ 25mg,day1- 21,DEX40mg/week	(緊) ダラキユロ配合皮下注15ml/V:1V Day1 Day15	-
46	blo096	血液-内;MM_[7]-7目以降]scDLd療法【4週毎】	scガラムマ 1800mg/body day1,レナリドミ 25mg day1- 21,DEX40mg/week※PDまで	(緊) ダラキユロ配合皮下注15ml/V:1V Day1	-
47	blo099	血液-内;NHL_テニロイシンシフチクス(レミト)療法【3週毎】	テニロイシンシフチクス (レミト) 9μg/kg 最大8J-8まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (緊) レミト点滴静注用 300μg:9μg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水フロー20ml :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	-

48	blo101	血液-内-入;730_【2】-入目]scDCyBD療法[4週毎]	scガラムマ" 1800mg/body day1,8,15,22 CPA(内服)300mg/mday1,8,15,22 ホルミジ" 1.3mg/m day1,8,15,22 DEX(内服)40mg /週	(緊) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22 ペルケイド注射用 3 mg:1.3mg/m Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 0 m L / A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
49	blo102	血液-内;730_【3-6】-入目]scDCyBD療法[4週毎]	scガラムマ" 1800mg/body day1,15, CPA(内服)300mg/mday1,8,15,22 ホルミジ" 1.3mg/m day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	(緊) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day15 ペルケイド注射用 3 mg:1.3mg/m Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 0 m L / A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
50	blo103	血液-内;730_【7】-入目以降]scDCyBD療法[4週毎]	scガラムマ" 1800mg/body day1, DEX(内服)20mg day1	(緊) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1	-
51	blo105	血液-内;MM_【2】-入目以降]Isakd療法[4週毎]	イザキマ" 10mg/kg day1,15, カブリマ" 56mg/mday1,2,8,9,15,16, アサメタリ" 40mg/week	生食注250m L /袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 デキサート注射液 3 : 3 mg /mL/A:6A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生食注100m L (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 (緊) サーキュラ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 Day15 生食注 5 0 m L (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (緊) カイブロス点滴静注用 (規格なし) :56mg/m Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100m L :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100m L /B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
52	blo106	血液-内NHL_FCM療法[4週毎]	※最大4J-入	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラセトロン点滴静注/ワグ 1 mg/5 0 mL/HKJ:1本 Day1 Day2 Day3 (緊) フルダ静注用 5 0 m g:25mg/m Day1 Day2 Day3 注射用水フリードム L :1A Day1 Day2 Day3 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 エンドキサン注(規格なし):200mg/m Day1 Day2 Day3 生食注 5 0 0 m L /袋(点滴用) :1本 Day1 Day2 Day3 (口座) ノバトロン注 2 0 mg/1 0 mL/V:8mg/m Day2 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day2	中等度