

## 【大腸がん(外来)】

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名:数量 投与日	嚥吐性リスク
1 col001	大腸-内;Pmab療法【2週毎】	パニコムマブ:6mg/kg 2週毎	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 (緊)ベクタビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
2 col002	大腸-内;CPT-11療法【2週毎】	CPT-11 150mg/mi	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):150mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度 (特定)
3 col003	大腸-外;mFOLFOX6療法【2週毎】	17-14日間【day1,15,29...】	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
4 col004	大腸-外;mFOLFOX6+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 ベバシズマブ BS点滴静注用 (規格なし) :5mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
5 col005	大腸-外;mFOLFOX6+Pmab療法【2週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 (緊)ベクタビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
6 col007	大腸-外;[27-6目-]mFOLFOX6+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 (緊) アピタクス注射液 100mg/20mL/V:250mg/mi Day1 Day8 生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
7 col008	大腸-外;FOLFIRI療法【2週毎】	17-14日間【day1,15,29...】	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL /袋:1袋 Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度 (特定)
8 col009	大腸-外;FOLFIRI+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 ベバシズマブ BS点滴静注用 (規格なし) :5mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL /袋:1袋 Day1 イリカバ塩酸塩点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロラシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度 (特定)

9	col010	大腸-外;FOLFIRI+Pmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)ペクテイクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 イリカ塩酸塩点滴静注液(トリー)(規格なし):150mg/ml Day1 イリカート点滴静注液(規格なし):200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):2400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
10	col012	大腸-外;[2ヶ月毎]FOLFIRI+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 (緊)アビタクス注射液 100mg/20mL/V:250mg/ml Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 イリカ塩酸塩点滴静注液(トリー)(規格なし):150mg/ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 イリカート点滴静注液(規格なし):200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
11	col013	大腸-外;FOLFIRI+RAM療法【2週毎】	day1 RAM 8mg/kg,,CTP-11 150mg/m2,5-FU 400mg/m2,5FU 2400mg/m2	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 (緊)サイラムガム点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イリカ塩酸塩点滴静注液(トリー)(規格なし):150mg/ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イリカート点滴静注液(規格なし):200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
12	col014	大腸-外;FOLFIRI+ザルトリップ療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ザルトリップ注(規格なし):4mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 イリカ塩酸塩点滴静注液(トリー)(規格なし):150mg/ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イリカート点滴静注液(規格なし):200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
13	col015	大腸-外;XELOX(CapeOX)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
14	col016	大腸-外;XELOX(CapeOX)+Bmab療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベバシズマブ BS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
15	col017	大腸-外;SOX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
16	col018	大腸-外;SOX+Bmab療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベバシズマブ BS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度

17	col019	大腸-外;Cet-+Bmab療法【4週毎】	ヘボシマツア 5mg/kg (day1, 15)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 ベバシズマツ BS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15	中等度
18	col020	大腸-外;IRIS療法【4週毎】	CPT-11 day1,15 S-1 day1~14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3, 3mg/mL/A:2A Day1 Day15 リカルボン酸塩点滴静注液「トワリ」(規格なし):100mg/ml Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15	中等度 (特定)
19	col022	大腸-外;肝転移WHF+CDDP療法【weekly】	★肝動脈注 CDDP (20mg/body) + 5-FU (1000mg/m2)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3, 3mg/mL/A:3A Day1 シスプラチン注「日医工」(規格なし):20mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):1000mg/ml Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1	中等度に 準ずる
20	col023	大腸-外;5FU/LV療法	[1イクリ56日間6投2休] day1,8,15,22,29,36 5FU600mg/m2, LV250mg/m2 【アゴーラントは全3回イクリ】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3, 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ヘボシマツア点滴静注用(規格なし):250mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):600mg/ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1	軽度