

## 【婦人科がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名:数量 投与日	嚥吐性リスク
1 gyn001	婦;TC療法【4週毎】	CBDCA(AUC:5),PTX 175mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:6A Day1 ワモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 バクリタキセル静注「オゼローラ」(規格なし) :175mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 50.0mL (ソフト) :1本 Day1 加替 <sup>ア</sup> ゾン点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
2 gyn002	婦;TC+Bmab療法【2-6】->【4週毎】	CBDCA(AUC:5),PTX 175mg/m <sup>2</sup> ,Bmab 15mg/kg【最大6コース目まで】	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:6A Day1 ワモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 バクリタキセル静注「オゼローラ」(規格なし) :175mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 50.0mL (ソフト) :1本 Day1 加替 <sup>ア</sup> ゾン点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 生食注 50.0mL (針なし) :1本 Day1 アバスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100.0mL (針なし) :1本 Day1	中等度(特定)
3 gyn003	婦;Bmab単剤療法【7-22】->【4週毎】	Bmab 15mg/kg【最大223-7目まで】	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 アバスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100.0mL (針なし) :1本 Day1	最小度
4 gyn004	婦;卵巣癌_DC療法【1】->【4週毎】	CBDCA(AUC:5),DTX 70mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ドキソチブロ点滴静注液「ニブロ」(規格なし) :70mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 加替 <sup>ア</sup> ゾン点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
5 gyn005	婦;卵巣癌_DC+Bmab療法【2-6】->【4週毎】	CBDCA(AUC:5),DTX 70mg/m <sup>2</sup> ,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ドキソチブロ点滴静注液「ニブロ」(規格なし) :70mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 加替 <sup>ア</sup> ゾン点滴静注液「日医工」(規格なし) :0mg/A Day1 生食注 50.0mL (針なし) :1本 Day1 アバスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100.0mL (針なし) :1本 Day1	中等度(特定)
6 gyn007	婦;卵巣癌_ddTC療法【4週毎】	CBDCA(AUC:5) day1,PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ワモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100.0mL (針なし) :1本 Day8 Day15 バクリタキセル静注「オゼローラ」(規格なし) :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加替 <sup>ア</sup> ゾン点滴静注液「日医工」(規格なし) :0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
7 gyn008	婦;卵巣癌_ddTC+Bmab療法【4週毎】	CBDCA(AUC:5) day1,PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,Bmab 15mg/kg day1	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ワモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100.0mL (針なし) :1本 Day8 Day15 バクリタキセル静注「オゼローラ」(規格なし) :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加替 <sup>ア</sup> ゾン点滴静注液「日医工」(規格なし) :0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 アバスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100.0mL (針なし) :1本 Day1	中等度(特定)
8 gyn010	婦;卵巣癌_PLD+ CBDCA+Bmab療法【4週毎】	PLD(ドキル) 30mg/m <sup>2</sup> ,CBDCA(AUC:5),Bmab 15mg/kg	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ドキソチブロ点滴静注液「日医工」(規格なし) :30mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 加替 <sup>ア</sup> ゾン点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 25.0mL/B:1本 Day1 生食注 50.0mL (針なし) :1本 Day1 アバスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100.0mL (針なし) :1本 Day1	中等度(特定)

9	gyn012	婦;PLD単剤療法【4週毎】	PLD(ドキソチル) 40mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL／袋:1袋 Day1 グリニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ドキソチル注 20mg/10mL:40mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度
10	gyn013	婦;PLD+Bmab療法【3週毎】	PLD(ドキソチル) 30mg/m <sup>2</sup> ,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL／袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 ドキソチル注 20mg/10mL:30mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 アバズチン点滴静注用（規格なし）:15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	中等度
11	gyn014	婦;GEM単独療法【3投1休】[4週毎]	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	生食注 250mL／袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用「NK」（規格なし）:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15	軽度
12	gyn015	婦;卵巣癌_GEM+Bmab療法【3週毎】	Bmab 15mg/kg,GEM 1000mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL／袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 アバズチン点滴静注用（規格なし）:15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 ゲムシタビン点滴静注用「NK」（規格なし）:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8	軽度
13	gyn020	婦;絨毛性疾患_EP療法【4週毎】	CBDCA 250mg/m <sup>2</sup> day1,VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1,3,5	生食注 250mL／袋:1袋 Day1 Day3 Day5 グリニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day3 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day3 Day5 加味アラビン点滴静注液「日医工」（規格なし）:250mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 エトボシド点滴静注液100mg「リゾ」 100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day5 生食注 500mL／袋 (点滴用) :1本 Day1 Day3 Day5	中等度 (特定)
14	gyn021	婦;臨床的侵入奇胎_WeeklyMTX(筋注)【毎週】	MTX 50mg/m <sup>2</sup>	メソトレキセート注(規格なし 通常療法):50mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用水フリーアルコール20mL:1A Day1	最小度
15	gyn023	婦;子宮肉腫-婦;(short) AP (ADM+CDDP) 療法【3週毎】	ADM 60mg/m <sup>2</sup> CDDP 50mg/m <sup>2</sup> 自安 ; 6コース 65歳以上 ADM60mg/m <sup>2</sup> . 65歳<ADM45mg/m <sup>2</sup>	生食注 500mL／袋 (点滴用) :1本 Day1 パリセドリ点滴静注「ザガ」 0.75mg/50mL「タキ付」 (7月以降発) :1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ドキルビシン塩酸塩注(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 シズラブリ点滴静注「マルコ」(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day1 ラクチック注 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 プロセミド注「トーリ」 2.0mg/2mL/A:1A Day1 20%マンitol注射液「Y D」 300mL/袋 Day1 KN 3号輸液 500mL:1袋 Day1	高度
16	gyn024	婦;侵入奇胎_アチマイシンDアル療法【2週毎】		生食注 250mL／袋:1袋 Day1 グリニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 (緊) コスメグロ静注用 0. 5mg:1.25mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用水フリーアルコール20mL:1A Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	中等度
17	gyn025	婦;子宮体癌_△ムラミスマ+レバチニブ療法【3週毎】	△ムラミスマ 200mg/body day1,レバチニブ 1回20mg/1日1回連日 ※PDまで **△ムラミスマは最大35回まで	生食注 250mL／袋:1袋 Day1 (緊) キトトーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度

18	gyn026	婦-入;子宮頸癌_ <sup>△</sup> ムラサキマツ+TC+Bmab療法 【3週毎】	<p>※最大6J→維持療法(△ムラサキマツ+Bmab) (△ムラサキマツ) マツは計35回まで)</p> <p>生食注 250mL／袋 (点滴用) :1本 Day1 グリニセトロ点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3 - 3mg/mL/A:6A Day1 ファモチジン静注 2.0mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 バクリタセル静注「ホスピテ」(規格なし) :175mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト) :1本 Day1 加熱アミノ点滴静注液[日医工] (規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アバスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 キイトルーガ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1</p>	中等度 (特定)
19	gyn027	婦-入;子宮頸癌_ <sup>△</sup> ムラサキマツ+TC+Bmab療法【3週毎】	<p>【維持療法】△ムラサキマツ+TC+Bmab療法 最大6J→後に実施。(△ムラサキマツは導入療法と合わせて計35回)</p> <p>生食注 250mL／袋 (点滴用) :1本 Day1 アバスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 キイトルーガ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1</p>	最小度