

【胃がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名:数量 投与日	嚥吐性リスク
1 gas001	胃-内;RAM+PTX療法【4週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フモチジン静注 2.0mg/日新【希釀液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注「ホスピ-」(規格なし):80mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 (繁)サイラムガ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	軽度
2 gas003	胃-内;CPT-11療法【2週毎】	CPT-11 150mg/m	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ドリカ塩酸塩点滴静注液「SUN」(規格なし):150mg/m Day1 5%ブドウ糖注500mL(ソフト):1本 Day1	中等度(特定)
3 gas004	胃-内;SOX療法【3週毎】	3週毎 S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリブチニン点滴静注液(規格なし):100mg/m Day1 5%ブドウ糖注500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
4 gas005	胃-内;RAM+nabPTX療法【4週毎】	#行かず 8mg/kg,day1,15,nab- PTX100mg/m2,day1,8,15,注)day15スキップ時でも休薬期間は短縮しないこと	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 (繁)アブラキサン点滴静注液 100mg (特生物):100mg/m Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
5 gas006	胃-外;DTX療法【3週毎】	3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ドセカゼ点滴静注液「ニブロ」(規格なし):70mg/m Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	軽度
6 gas008	胃-外;S-1+DTX療法【3週毎】	S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ドセカゼ点滴静注液「ニブロ」(規格なし):40mg/m Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	軽度
7 gas009	胃-外;PTX(80mg/m)療法【weekly】	weekly PTX 80mg/m2	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フモチジン静注 2.0mg/日新【希釀液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注「ホスピ-」(規格なし):80mg/m Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	中等度に準ずる
8 gas014	胃-外;ニボルマフ療法【2週毎】	ニボルマフ 240mg/body ※3次治療以降に導入を検討	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジ-ホ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
9 gas015	胃-外;[7ク-ル目-]Tmab(8)+Cape(CDDP無)療法【3週毎】	HER+XP療法7ク-ル目以降,HER8mg/kg,+ cape2000mg/m2【3週毎】 ★☆HER 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブDS点滴静注用「NJK」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水1000mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度

10	gas016	胃-外;[ア-ル目-]Tmab(6)+Cape(CDDP無)療法【3週毎】	HER + XP療法7-8日目以降,HER6mg/kg, + cape2000mg/m2【3週毎】 ★☆HER : 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用[NKJ](規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1	最小度
11	gas017	胃-外;トスツズマブ テムクシテカン(エン-ル)療法【3週毎】	トスツズマブ テムクシテカン6.4mg/kg	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 パロセトロン点滴静注パック1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:2A Day1 (緊)エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
12	gas018	胃-外;mFOLFOX6療法【2週毎】	13-14日間	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセトロン点滴静注パック1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 レバリート点滴静注液(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100mL Day1	中等度 (特定)
13	gas019	胃-外;ニボルマブ+SOX療法【3週毎】	S-1:day1-14 ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)オブジ-エ点滴静注 240mg/24mL/V:1V Day1 (緊)オブジ-エ点滴静注 120mg/1.2mL/V:1V Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 グラセトロン点滴静注パック1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
14	gas020	胃-内;RAM単独I療法【2週毎】	RAM 8mg/kg ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1	最小度
15	gas021	胃-外;[初回]Tmab(8)+SOX療法【3週毎】	3週毎 ※PDまで S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トスツズマブBS点滴静注用[NKJ](規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセトロン点滴静注パック1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
16	gas022	胃-外;[2-ル目-]Tmab(6)+SOX療法【3週毎】	3週毎 ※PDまで S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トスツズマブBS点滴静注用[NKJ](規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセトロン点滴静注パック1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
17	gas024	胃-内;[2-ル目-]Tmab+mFOLFOX6療法	mFOLFOX6 (day1.15.29), Tmab (day1.22 6mg/kg) ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 Day22 Day29 グラセトロン点滴静注パック1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day15 Day29 デキサート注射液3, 3mg/mL/A:3A Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/mi Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250mL/B:2本 Day1 Day15 Day29 レバリート点滴静注液(規格なし):200mg/mi Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 Day15 Day29 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day15 Day29 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 Day15 Day29 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15 Day29 トスツズマブBS点滴静注用[NKJ](規格なし):6mg/kg Day1 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day22	中等度 (特定)