

【肝臓がん・胆道がん・膵臓癌(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	嚥吐性リスク
1 liv001	肝胆膵-内;胆道癌CDDP+GEM療法【3週毎】	シスプラチン25mg/m ² +ゲムシタビン1000mg/m ² day1,8~21日で1回×3	生食注 500mL/袋（点滴用）:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL（針なし）:1本 Day1 Day8 シスプラチン注「アルコ」（規格なし）（後発品）:25mg/m ² Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用「NKJ」（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL（針なし）:1本 Day1 Day8	中等度（特定）に準ずる
2 liv002	肝胆膵-内;膵癌nabPTX+GEM療法【4週毎】	nab-PTX 125mg/m ² +ゲムシタビン1000mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グリセトロン点滴静注用「ワグ1mg/50mL」HKL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg（特生物）:125mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL（針なし）:1本 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL（針なし）:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用「NKJ」（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL（針なし）:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
3 liv003	肝胆膵-外;GEM+S-1療法【1投1休】【2週毎】	GEM（1投1休）、S-1（day1～7内服、day8～14休業）	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL（針なし）:1本 Day1 ゲムシタビン点滴静注用「NKJ」（規格なし）:1000mg/m ² Day1 生食注 100mL（針なし）:1本 Day1	軽度
4 liv004	肝胆膵-外;胆道癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL（針なし）:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用「NKJ」（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL（針なし）:1本 Day1 Day8 Day15	軽度
5 liv005	肝胆膵-外;膵癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL（針なし）:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用「NKJ」（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL（針なし）:1本 Day1 Day8 Day15	軽度
6 liv006	肝胆膵-外;膵癌FOLFIRINOX療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パロセトロップ点滴静注用「カ」0.75mg/50mL「タキ」（アモジ後発）:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキソラブチニン点滴静注液（規格なし）:85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖250mL/B:1本 Day1 「ホリナート」点滴静注液（規格なし）:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖250mL/B:1本 Day1 「ドクターカ塩酸塩」点滴静注液「トワ」（規格なし）:180mg/m ² Day1 5%ブドウ糖250mL/B:1本 Day1 「ホリナート」点滴静注用（規格なし）:200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注（規格なし）:400mg/m ² Day1 生食注 50mL（針なし）:1本 Day1 フルオロウラシル注（規格なし）:2400mg/m ² Day1 生食注 100mL（針なし）:100ml Day1	高度
7 liv009	肝胆膵-外;肝癌RAM療法【2週毎】	サイラム® 8mg/kg ★ AFP400ng/mL以上であること、Child-Pugh分類Aであること確認★	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊) サイラム®点滴静注液（規格なし）:8mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
8 liv010	肝胆膵-外;膵癌GS療法【3週毎】	GEM（day1,8）、S-1（2投1休）	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL（針なし）:1本 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用「NKJ」（規格なし）:1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL（針なし）:1本 Day1 Day8	軽度

9	liv011	肝胆脾-外;肺癌 ^{ホルマジ} +FF療法【2週毎】	二次治療以降の使用であること。	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グリセトロン点滴静注(4袋 1mg/50mL「HK」):1本 Day1 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:2A Day1 (繁) オニバイド点滴静注43mg:70mg/ml Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ホルマジナート点滴静注用(規格なし):200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロワラシル注(規格なし):2400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
10	liv012	肝-外;アツリマジ ^{マジ} +Bmab療法【3週毎】	【切除不能な肝細胞癌】 (day1)アツリマジ:1200mg/body, Bmab:15mg/kg,※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繁) テセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
11	liv013	肝胆脾-内;肺癌_modifiedFOLFIRINOX療法【2週毎】	PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ハリセトロン点滴静注(4袋 0.75mg/50mL「タイホ」)(4回後発):1本 Day1 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:3A Day1 オキザリチブチニン点滴静注液(規格なし):85mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ホルマジナート点滴静注用(規格なし):200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ソルカバ塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):150mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロワラシル注(規格なし):2400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	高度
12	liv015	肝胆脾-外;胆道癌 ^{ホルマジ} +GC療法【3週毎】	※8コース投与後→テムバ ^{マジ} 1500療法へ	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/ml Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3...3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 シスコラブチ点滴静注用「マルコ」(規格なし):25mg/ml Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 イミンジン注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	高度
13	liv016	胆管脾-外;テムバ ^{マジ} 1500療法【4週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミンジン注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
14	liv017	肝胆脾-外;トレリムマジ+テムバ ^{マジ} 療法【1回-3回】	肝癌、トレリムマジ+テムバ ^{マジ} 療法1コース投与 →テムバ ^{マジ} 1500療法【4週毎】へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イソド点滴静注 3000mg/1.5mL:300mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 イミンジン注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度