

## [泌尿器科腫瘍(外来)]

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名:数量 投与日	催吐性リスク
1 uro001	泌;DTX(70mg/mi)+PSL療法【3週毎】	DTX 70mg/mi,PSL 10mg/day連日内服	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート点滴静注液「ニプロ」(規格なし):70mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度に準じる
2 uro002	泌;尿路上皮癌_GEM単独療法【3投1休】【4週毎】	GEM 1000mg/mi day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
3 uro009	泌;前立腺癌_Cbz+PSL療法【3週毎】	CBZ 25mg/mi,PSL 10mg/day連日内服	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ボラジン注 5mg/1mL/A:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ファモチジン静注 20mg「日新」「希釈液不要」:1A Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 (繋)ジガブナ点滴静注 6.0mg:25mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
4 uro011	泌;腎癌_ニホルマフ療法【2週毎】	ニホルマフ 240mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
5 uro012	泌;尿路上皮癌_GEM+CBDCA療法【3週毎】	CBDCA(AUC:5) day1,GEM 1000mg/mi day1,8	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタビン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/mi Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 加替「ヤン」点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ドク糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
6 uro013	泌;尿路上皮癌_ヒドロキシマフ療法【3週毎】	ヒドロキシマフ 200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繋)キイトルータ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
7 uro014	泌;腎癌_ニホルマフ+ヒドロキシマフ療法【3週毎】	ニホルマフ 240mg/body,ヒドロキシマフ 1mg/kg 併用投与期間は3週毎4サイクル、その後ニホルマフ単独へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (繋)ヤーボイ点滴静注 50mg/10mL/V:1mg/kg Day1 生食注 50mL(針なし):30ml Day1	最小度
8 uro016	泌;腎癌_ヒドロキシマフ+アキチニフ療法【3週毎】	ヒドロキシマフ 200mg/body day1,アキチニフ 1回5mg 1日2回連日 **ヒドロキシマフは最大35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繋)キイトルータ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
9 uro017	泌;精巣腫瘍_CPT-11+NDP療法【4週毎】	CPT-11 200-300mg/mi+NDP 100mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 リホカイン塩酸塩点滴静注液「トリ」(規格なし):300mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 (繋)アブリブ静注用(規格なし):100mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 ラグテック注 500mL/袋:1袋 Day1 KN3号輸液 500mL:1袋 Day1	中等度(特定)

10	uro018	泌;尿路上皮癌_アボルマフ療法【2週毎】	アボルマフ 10mg/kg ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (繋) バベシオ点滴静注 200mg/10mL:10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
11	uro019	泌;尿路上皮癌_イノホルマフ ハドニク療法【4週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (繋) バドセブ点滴静注用 30mg:1.25mg/kg Day1 Day8 Day15 注射用水フリーザー20mL:1A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15	軽度
12	uro020	泌-入;腎癌_ニボルマフ+カキザンチニブ療法【2週毎】	ニボルマフ 240mg/body day1,カキザンチニブ 1回40mg 1日1回 連日 **ニボルマフは最長2年間まで	生食注 250mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 (繋) オブジー点滴静注 240mg/24mL/V:1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
13	uro021	泌;腎癌_ペムザリスマフ+レンバチニブ療法【3週毎】	ペムザリスマフ 200mg/body day1,レンバチニブ 1回20mg 1日1回 連日 ※PDまで **ペムザリスマフは最大35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーグ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
14	uro022	泌;腎癌_ペムザリスマフ+アキシニブ療法【6週毎】	ペムザリスマフ 400mg/body day1,アキシニブ 1回5mg 1日2回 連日 **ペムザリスマフ投与は最大約2年	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーグ点滴静注 100mg/4mL/V:400mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
15	uro023	泌;尿路上皮癌_ニボルマフ療法【2週毎】	※adjuvant (最長1年間まで) ニボルマフ 240mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジー点滴静注 (規格なし):240mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度