

【胃がん(外来)】

最終更新令和6年12月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 gas001	胃-内;RAM+PTX療法【4週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ファミチン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラム点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	軽度
2 gas003	胃-内;CPT-11療法【2週毎】	CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 トリカドリン点滴静注液(規格なし):150mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフ):1本 Day1	中等度 (特定)
3 gas004	胃-内;SOX療法【3週毎】	3週毎 S-1day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフ):1本 Day1	中等度
4 gas005	胃-内;RAM+nabPTX療法【4週毎】	サイラム 8mg/kg,day1,15,nab-PTX100mg/m <sup>2</sup> ,day1,8,15;注day15スキップ時でも休業期間は短縮しないこと	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 サイラム点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 アラキサン点滴静注用 100mg(特生物):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
5 gas008	胃-外;S-1+DTX療法【3週毎】	S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ドレクチン点滴静注液(規格なし):40mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
6 gas009	胃-外;PTX(80mg/m)療法【weekly】	weekly PTX 80mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ファミチン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる
7 gas014	胃-外;ニボルマブ療法【2週毎】	ニボルマブ 240mg/body ※3次治療以降に導入を検討	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
8 gas015	胃-外;【7ケル目-】Ttab(8)+Cape(CDDP無)療法【3週毎】	HER+XP療法7ケル目以降,HER8mg/kg,+cape2000mg/m <sup>2</sup> 【3週毎】 ★☆☆HER 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度

9	gas016	胃-外;【7-ル目-】Tmab(6)+Cape(CDDP無)療法【3週毎】	HER+XP療法7-ル目以降,HER6mg/kg,+cape2000mg/m2【3週毎】 ★☆HER:6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1	最小度
10	gas017	胃-外;トラスツスマブ デノムステカ(17-ル)療法【3週毎】	トラスツスマブ デノムステカ6.4mg/kg	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 パロセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
11	gas018	胃-外;mFOLFOX6療法【2週毎】	11-14日間	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 i*射点点滴静注用(規格なし):200mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m Day1 生食注 100mL(針なし):100mL Day1	中等度 (特定)
12	gas019	胃-外;ニルマブ+SOX療法【3週毎】	S-1:day1-14 ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーホ点滴静注 240mg/24mL/V:1V Day1 オブジーホ点滴静注 120mg/12mL/V:1V Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/m Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフ):1本 Day1	中等度
13	gas020	胃-内;RAM単独I療法【2週毎】	RAM 8mg/kg ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1	最小度
14	gas021	胃-外;【初回】Tmab(8)+SOX療法【3週毎】	3週毎 ※PDまで S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/m Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフ):1本 Day1	中等度
15	gas022	胃-外;【2-ル目-】Tmab(6)+SOX療法【3週毎】	3週毎 ※PDまで S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):100mg/m Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフ):1本 Day1	中等度
16	gas024	胃-内;【2-ル目-】Tmab+mFOLFOX6療法	mFOLFOX6 (day1.15.29), Tmab (day1.22.6mg/kg) ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 Day22 Day29 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 Day29 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day15 Day29 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250mL/B:2本 Day1 Day15 Day29 i*射点点滴静注用(規格なし):200mg/m Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m Day1 Day15 Day29 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day15 Day29 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m Day1 Day15 Day29 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15 Day29 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day22	中等度 (特定)

17	gas026	胃-外;【2-12】-λ目】t`0i+mFOLFOX6療法【2週毎】	CLDN18.2陽性HER2陰性進行・再発胃癌 mFOLFOX6 (day1) ,t`0i (day1 : 400mg/m) ※最大12コースまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パロ/セトロン点滴静注(バッグ0.75/50mL):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ピロイ静注用:400mg/m Day1 大塚蒸留水 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 (規格なし) :180mL/m 生食注50mL/本:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m Day1 5%ブドウ糖注250mL/本:1本 Day1 i`k`0i点滴静注用 (規格なし) :200mg/m Day1 5%ブドウ糖注250mL/本:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :400mg/m Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :2400mg/m Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	高度
18	gas027	胃-外;t`0i+5-FU/LV療法【2週毎】	CLDN18.2陽性HER2陰性進行・再発胃癌 5-FU (day1) ,t`0i (day1 : 400mg/m) ※PDまで※t`0i支持薬省略可	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パロ/セトロン点滴静注(バッグ0.75/50mL):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ピロイ静注用:400mg/m Day1 大塚蒸留水 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 (規格なし) :180mL/m 生食注50mL/本:1本 Day1 i`k`0i点滴静注用 (規格なし) :200mg/m Day1 5%ブドウ糖注250mL/本:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :400mg/m Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :2400mg/m Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	高度
19	gas029	胃-外;【2-8】-λ目】t`0i+CAPOX療法【3週毎】	CLDN18.2陽性HER2陰性進行・再発胃癌 t`0i (day1 : 600mg/m) ,L-OHP (day1 : 130mg/m) ※最大8コースまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パロ/セトロン点滴静注(バッグ0.75/50mL):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ピロイ静注用:600mg/m Day1 大塚蒸留水 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 (規格なし) :270mL/m 生食注50mL/本:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m Day1 5%ブドウ糖注500mL/本:1本 Day1	高度
20	gas030	胃-外;t`0i+加`0i療法【3週毎】	CLDN18.2陽性HER2陰性進行・再発胃癌 t`0i (day1 : 600mg/m) ※PDまで※t`0i支持薬省略可	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パロ/セトロン点滴静注(バッグ0.75/50mL):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ピロイ静注用:600mg/m Day1 大塚蒸留水 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 (規格なし) :270mL/m	高度
21	gas031	胃-外;Pembro+SOX療法【3週毎】	※化学療法歴がないPD-L1陽性かつHER2陰性の進行・再発の胃癌であること Pem (day1 : 200mg) ,L-OHP (day1 : 130mg/m) ※最大35コースまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ1mg/50mL):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :130mg/m Day1 5%ブドウ糖注500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度