

【大腸がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 col003	大腸-外;mFOLFOX6療法【2週毎】	1ヶ-#14日間【day1,15,29・・・】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 i*#リット点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
2 col004	大腸-外;mFOLFOX6+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 i*#リット点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
3 col005	大腸-外;mFOLFOX6+Pmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベクテビックス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 i*#リット点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
4 col007	大腸-外;[2ヶ-#目-]mFOLFOX6+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 アーピタタクス注射液 100mg/20mL/V:250mg/mi Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 i*#リット点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
5 col008	大腸-外;FOLFIRI療法【2週毎】	1ヶ-#14日間【day1,15,29・・・】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 イリリカ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 i*#リット点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
6 col009	大腸-外;FOLFIRI+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 イリリカ塩酸塩点滴静注液(SUNJ)(規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 i*#リット点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
7 col010	大腸-外;FOLFIRI+Pmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベクテビックス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 イリリカ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/mi Day1 i*#リット点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)

8	col012	大腸-外;[2ヶ-#目-]FOLFIRI+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8            グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1            デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8            アービタクス注射液 100mg/20mL/V:250mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8            生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8            イリテカ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1            ｲｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞ点滴静注用(規格なし):200mg/m<sup>2</sup> Day1            5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1            フルオロウラシル注(規格なし):400mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 50mL(針なし):1本 Day1            フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 100mL(針なし):100ml Day1</p>	中等度 (特定)
9	col013	大腸-外;FOLFIRI+RAM療法【2週毎】	day1 RAM 8mg/kg,CTP-11 150mg/m <sup>2</sup> ,5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ,5FU 2400mg/m <sup>2</sup>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1            デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1            サイラム点点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1            Day1生食注 250mL/袋:1袋 Day1            イリテカ塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1            ｲｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞ点滴静注用(規格なし):200mg/m<sup>2</sup> Day1            5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1            フルオロウラシル注(規格なし):400mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 50mL(針なし):1本 Day1            フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 100mL(針なし):100ml Day1</p>	中等度 (特定)
10	col014	大腸-外;FOLFIRI+ﾀﾞｷﾞｷﾞｷﾞ療法【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1            デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1            ｼﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ注(規格なし):4mg/kg Day1            生食注 100mL(針なし):1本 Day1            イリテカ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1            ｲｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞ点滴静注用(規格なし):200mg/m<sup>2</sup> Day1            5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1            フルオロウラシル注(規格なし):400mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 50mL(針なし):1本 Day1            フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 100mL(針なし):100ml Day1</p>	中等度 (特定)
11	col015	大腸-外;XELOX(CapeOX)療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1            デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1            オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m<sup>2</sup> Day1            5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1</p>	中等度
12	col016	大腸-外;XELOX(CapeOX)+Bmab療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            ｲﾍﾞﾝｼﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1            生食注 100mL(針なし):1本 Day1            グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1            デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1            オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m<sup>2</sup> Day1            5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1</p>	中等度
13	col018	大腸-外;SOX+Bmab療法【3週毎】	S-1:day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            ｲﾍﾞﾝｼﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1            生食注 100mL(針なし):1本 Day1            グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1            デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1            オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m<sup>2</sup> Day1            5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1</p>	中等度
14	col019	大腸-外;ﾀﾞｷﾞｷﾞｷﾞ+Bmab療法【4週毎】	ﾊﾞﾙｼﾞｽﾞﾏﾌﾞ 5mg/kg (day1、15) ﾀﾞｷﾞｷﾞｷﾞday1-5,8-12	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15            ｲﾍﾞﾝｼﾞｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 Day15            生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15</p>	中等度
15	col022	大腸-外;肝転移WHF+CDDP療法【weekly】	★肝動脈注 CDDP (20mg/body) + 5-FU (1000mg/m <sup>2</sup> )	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1            デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1            シスプラチン注(規格なし):20mg Day1            生食注 100mL(針なし):1本 Day1            フルオロウラシル注(規格なし):1000mg/m<sup>2</sup> Day1            生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1</p>	中等度に 準ずる

16	col023	大腸-外;5FU/LV療法	【1サイクル56日間6投2休】 day1,8,15,22,29,36 5FU600mg/m2、LV250mg/m2 【アミノ酸は全3サイクル】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):250mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし):600mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1	軽度
17	col025	大腸-外;【②-】Cmab+レキソト+レキソト療法【毎週】	Cmab 250mg/mi day1,1週間1回300mg1日1回連日、レキソト1回45mg1日2回連日 ※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/mi Day1	軽度
18	col026	大腸-外;★Cmab+レキソト+レキソト療法【2週毎】	Cmab 500mg/mi day1,1週間1回300mg1日1回連日、レキソト1回45mg1日2回連日 ※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/mi Day1	軽度
19	col027	大腸-外;FOLFIRI+Cmab500療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること ※PDまで	生食注 250mL/袋:3袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):150mg/mi Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし):400mg/mi Day1 フルオロウラシル注 (規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
20	col028	大腸-外;mFOLFOX6+Cmab500療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:2本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):200mg/mi Day1 フルオロウラシル注 (規格なし):400mg/mi Day1 フルオロウラシル注 (規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
21	col029	大腸-外;【1-1日目】Cmab+XELOX(CapeOX)療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1,8,15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1,2A Day8,15 アービタックス点滴静注用:400mg/mi Day1,250mg/mi Day8,15 生食注 250mL (針なし):1本 Day1,8,15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1	中等度
22	col030	大腸-外;【2-3日目以降】Cmab+XELOX(CapeOX)療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1,8,15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1,2A Day8,15 アービタックス点滴静注用:250mg/mi Day1,8,15 生食注 250mL (針なし):1本 Day1,8,15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1	中等度
23	col031	大腸-外;CPT-11+Pmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベクテビックス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 レキソト点滴静注用(規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)

24	col032	大腸癌 FOLFOXIRI+Bmab【2週毎】	※最大12回(2Bmab,I-LV,5-FUはPDまで)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペバシズマブ注射液:5mg/kg Day1 生食注 100mL :1本 Day1 パロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 リリチン塩酸塩点滴静注液(規格なし):165mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト) 1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) 85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト) 1本 Day1 i* 射点点滴静注用 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :3200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	高度
25	col033	大腸癌 5FU/I-LV+Bmab療法【FOLFOXIRI+Bmab後維持】【2週毎】	FOLFOXIRI+Bmab療法12回後に使用、PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペバシズマブ注射液:5mg/kg Day1 生食注 100mL :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) 1本:Day1 i* 射点点滴静注用 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :3200mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	軽度
26	col034	大腸癌_CAPIRI+Bmab療法【3週毎】	*カベシタピン 1日2回(朝・夕) day1~day14 ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペバシズマブ注射液:7.5mg/kg Day1 生食注 100mL :1本 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 リリチン塩酸塩点滴静注液(規格なし):200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
27	col035	大腸-sLV5FU2+Bmab療法【2週毎】	リリチン (day1:400mg/m <sup>2</sup> ,day8,15:250mg/m <sup>2</sup> ),L-OHP (day1:130mg/m <sup>2</sup> ) ※RAS遺伝子野生型であること ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペバシズマブ注射液 (規格なし) :5mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 i* 射点点滴静注用 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト) :1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	軽度
28	col036	大腸癌 mFOLFOX6+Cmab500+リリチン療法【4週毎】	*リリチン(1000mg)1回300mg1日1回連日経口投与 *化学療法歴のないBRAF V600E変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌であること。 ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アービタックス注射液:500mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) 1本:Day1 オキサリプラチン塩酸塩点滴静注液(規格なし):85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B :1本 Day1 i* 射点点滴静注用 (規格なし) :200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 50mL :1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度