

【血液腫瘍(外来)】

最終更新令和6年12月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 blo001	血液-内;MDS/AML_アザチチン(ヒダラザ)皮下療法	5-2-2【28日間】※PDまで 制吐剤としてアザチチン投与前に170.1mg錠を服用 【MDS】 他の抗悪性腫瘍剤との併用は、有効性及び安全性は確立していない。 【AML】;ベネトクラスタとの併用療法の場合】 *ベネトクラスタ(ベネクレスタ)1日1回食後の連日投与	アザチチン注射液 1 0 0 m g :75mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用水フソール20m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9	中等度
2 blo002	血液-内;APL_ATO療法(寛解導入後)【25回】	三酸化二砒素0.15mg/kg,5週間の間に1日1回計25回	生食250mL/袋(点滴用) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 トリセックス注 1 2 m g 12mg/6mL/V:0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 250mL/袋 :1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	中等度であるが、制吐剤なしで対応
3 blo024	血液-内;NHL_R-THP-COP療法【3週毎】	※最大8回まで アトコをday3-7に服用	生食注 5 0 0 m L /袋(点滴用) :1本 Day1 ソル・コーテフ注射液100mg/V(溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/ml Day1 大塚生食注(規格なし) :337.5ml/ml Day1 生食注 5 0 0 m L /袋(点滴用) :1本 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1 m g / 5 0 m L :1本 Day3 オンコピン注 1 m g / V :1.4mg/ml Day3 生食注 2 0 m L / A :1A Day3 ビルビン注射液(規格なし):50mg/ml Day3 5%ブドウ糖注 1 0 0 m L / B :1本 Day3 エンドキサン注(規格なし):750mg/ml Day3 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day3	高度
4 blo025	血液-内;NHL_THP-COP療法【3週毎】	※最大8回まで アトコをday1-5に服用	生食注 5 0 0 m L /袋(点滴用) :1本 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1 m g / 5 0 m L :1本 Day1 オンコピン注 1 m g / V :1.4mg/ml Day1 生食注 2 0 m L / A :1A Day1 ビルビン注射液(規格なし):50mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 m L / B :1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):750mg/ml Day1 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1	高度
5 blo026	血液-内;NHL_RB療法【4週毎】	day1リツキシマブ375mg/m2 day2,3アザチチン90mg/m2	生食注 5 0 0 m L /袋(点滴用) :1本 Day1 ソル・コーテフ注射液100mg/V(溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/ml Day1 大塚生食注(規格なし) :337.5ml/ml Day1 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1 m g / 5 0 m L :1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3 . 3 m g / m L / A :3A Day2 Day3 トリアキシン点滴静注液100mg/4ml:90mg/ml Day2 Day3 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day2 Day3	中等度
6 blo028	血液-内;HL_ABVD療法【2週毎】	THP25mg/m2+BLM10mg/m2+VBL6mg/m2+DTIC375mg/m2	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 m g / m L / A :3A Day1 ビルビン点滴静注/バッグ0.75mg/50mL:1本 Day1 ビルビン注射液(規格なし):25mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 m L / B :1本 Day1 プレオ注射液15mg :10mg/ml Day1 生食注 2 0 m L / A :1A Day1 イクザール注 1 0 m g / V :6mg/ml Day1 生食注 2 0 m L / A :1A Day1 ダカルバジン注用 1 0 0 m g / V :375mg/ml Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m L / B :1本 Day1	高度
7 blo032	血液-内;ATLL_シタリキチン(キリシキチン)療法【毎週】	シタリキチン1mg/kg	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 ソル・コーテフ注射液100mg/V(溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day1 ポテリジオ点滴静注 2 0 m g :1mg/kg Day1 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1	-
8 blo038	血液-内;古典的HL_シタリキチン療法【2週毎】	シタリキチン240mg/body	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 オプジーホ注(規格なし):240mg Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day1	最小度
9 blo040	血液-内;PTCL_シタリキチン(イタリキチン)療法【4週毎】	シタリキチン day1,8,15 : 14mg/ml 電解質 (K,Mg,Ca等) 、B肝ウイルス、CD4陽性Tリンパ球、7日-14日過敏等確認	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3 . 3 m g / m L / A :2A Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1 m g / 5 0 m L :1本 Day1 Day8 Day15 イストラクス点滴静注用 1 0 m g :14mg/ml Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 0 m L /袋(点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15	-

10	blo044	血液-内;FL_[2-6]-7目]GB療法【4週毎】	カザイバ 1000mg/body (day1) ハンガ 90mg/m2 (day2,3) ※6ヶ月 ※アドリアーミは避ける	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ガザイバ点滴静注 1000mg:1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注/ツツ 1mg/50mL:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day2 Day3 ハンガ 90mg/m2点滴静注100mg/4mL:90mg/ml Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
11	blo045	血液-内;FL_北“マシマ” (カザイバ)維持療法【8週毎】	カザイバ (day1) ※最大2年間	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ガザイバ点滴静注 1000mg:1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1	-
12	blo054	血液-内;HL_A-AVD療法【2週毎】	未治療のCD30陽性HL【最大12コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パルリチン点滴静注/ツツ 0.75mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ピルピシ点注用(規格なし):25mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 エウザール注 10mg/V:6mg/ml Day1 生食注 20mL/A:1A Day1 ダカルバジン注用 100mg/V:375mg/ml Day1 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アドセリス点滴静注用 50mg/V:1.2mg/kg Day1 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	高度
13	blo055	血液-内;PTCL_A-THP-CP療法【3週毎】	未治療のCD30陽性PTCL【最大8コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/ツツ 1mg/50mL:1本 Day1 ピルピシ点注用(規格なし):50mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):750mg/ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アドセリス点滴静注用 50mg/V:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	-
14	blo058	血液-内;MM_#”リマ” (ハルバト)皮下療法(週1回)	4投1休【5週間】DEX(Day1,2,8,9,15,16,22)	ホルテゾミブ注射液 3mg/1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
15	blo065	血液-内;MM_[2]-7目以降]Kd療法(週1回)【4週毎】	加ワルマ”マ”70mg/ml (Day1, 8, 15) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15ml/分未満 で休業 DEX(Day22)	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:10A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用(規格なし):70mg/ml Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	-
16	blo067	血液-内;MM_[2]-7目]ELd療法【4週毎】	エロツズマブ10mg/kg (Day1,8,15,22),DEX(Day1,8,15,22),レプラミド(day1-21)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 エムアリシチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-
17	blo068	血液-内;MM_[3]-7目以降]ELd療法【4週毎】	エロツズマブ10mg/kg (Day1,15),DEX(Day1,15),レプラミド(day1-21)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day15 エムアリシチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day15 生食注 250mL/袋:230ml Day1 Day15	-
18	blo069	血液-内;MM_[1-2]-7目]EPd療法【4週毎】	エロツズマブ10mg/kg/day (day1,8,15,22),デキサメタゾン (day1,8,15,22), レプラミド(day1-21)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 エムアリシチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-

19	blo070	血液-内;MM_【3】-1目以降】EPd療法【4週毎】	エロツズマブ20mg/kg/day (day1) ,デキサメタゾン (day1,8,15,22) ,ボマリドミド (day1-21)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 エムアルティ点滴静注用 (規格なし) :20mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1	-
20	blo072	血液-内;MM_【2-3】-1目】DBd療法【3週毎】	ダラザレックス® 16mg/kg, day1,8,15,22, ヴェナトニ® 1.3mg/m2 day1,4,8,11,17, 21, 28 mg/week	ポルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15	-
21	blo073	血液-内;MM_【4-8】-1目】DBd療法【3週毎】	ダラザレックス® 16mg/kg, day1,8,15,22, ヴェナトニ® 1.3mg/m2 day1,4,8,11,17, 21, 28 mg/week	ポルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1	-
22	blo074	血液-内;MM_【9】-1目以降】DBd療法【4週毎】	ダラザレックス® 16mg/kg, day1	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1	-
23	blo075	血液-内;MM_【1】-1目】DLd療法【4週毎】	ダラザレックス® 16mg/kg, day1,8,15,22, ヴェナトニ® 25mg, day1~21, 28 mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
24	blo076	血液-内;MM_【2】-1目】DLd療法【4週毎】	ダラザレックス® 16mg/kg, day1,8,15,22, ヴェナトニ® 25mg, day1~21, 28 mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
25	blo077	血液-内;MM_【3-6】-1目】DLd療法【4週毎】	ダラザレックス® 16mg/kg, day1,15,22, ヴェナトニ® 25mg, day1~21, 28 mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day15	-
26	blo078	血液-内;MM_【7】-1目以降】DLd療法【4週毎】	ダラザレックス® 16mg/kg, day1, ヴェナトニ® 25mg, day1~21, 28 mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1	-
27	blo079	血液-内;神経系病_トリスチリン® (7755)療法【2週毎】	トリスチリン® (8mg/kg)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アクテムラ点滴静注用 (規格なし) :8mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	-
28	blo081	内科.MM【2】-1目以降】IsaPd療法【28日毎】	イサパドリン® 10mg/kg day1,15, 28 mg/day day1,8,15,22, ヴェナトニ® 4mg day1-21	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:12A Day1 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day15 サーカリア点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15	-

29	blo083	血液-内;MM_[2]-1目]DKd療法[4週毎]	ゲラミド 16mg/kg/day1,8,15,22,加メド 56mg/m ² day1,2,8,9,15,16,DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし):1本 Day2 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カプロリス点滴静注用(規格なし):56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
30	blo084	血液-内;MM_[3-6]-1目]DKd療法[4週毎]	ゲラミド 16mg/kg/day1,15,加メド 56mg/m ² day1,2,8,9,15,16,DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day16 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし):1本 Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カプロリス点滴静注用(規格なし):56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day15	-
31	blo085	血液-内;MM_[7]-1目以降]DKd療法[4週毎]	ゲラミド 16mg/kg/day1,加メド 56mg/m ² day1,2,8,9,15,16,DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day16 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 50mL (針なし):1本 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カプロリス点滴静注用(規格なし):56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1	-
32	blo086	血液-内;CLL_リキサン(375mg/m ²)療法[4週毎]	リキサン 初回375mg/m ² →2回目以降500mg/m ² ,最大投与回数6回、A* 補けり 400mg連日投与	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテブ注射液100mg/V(溶解液付):1V Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 リキサン注(規格なし):375mg/m ² Day1 大塚生食注(規格なし):337.5ml/m ² Day1	最小度
33	blo087	血液-内;CLL_リキサン(500mg/m ²)療法[4週毎]	リキサン 初回375mg/m ² →2回目以降500mg/m ² ,最大投与回数6回、A* 補けり 400mg連日投与	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテブ注射液100mg/V(溶解液付):1V Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 リキサン注(規格なし):500mg/m ² Day1 大塚生食注(規格なし):450ml/m ² Day1	最小度
34	blo089	血液-内;MM_[2-3]-1目]scDBd療法[3週毎]	scDBd 1800mg/body day1,8,15,加メド 1.3mg/m ² day1,4,8,11,デキサト 80mg/week	ボルネゾミブ注射液 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 ダラキュー-ロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15	-
35	blo090	血液-内;MM_[4-8]-1目]scDBd療法[3週毎]	scDBd 1800mg/body day1,加メド 1.3mg/m ² day1,4,8,11,デキサト 80mg/week	ボルネゾミブ注射液 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 ダラキュー-ロ配合皮下注:1V Day1	-
36	blo091	血液-内;MM_[9]-1目以降]scDBd療法[4週毎]	scDBd 1800mg/body day1,デキサト 80mg/day1	ダラキュー-ロ配合皮下注:1V Day1	-

37	blo092	血液-内;NHL_polaRB療法【4週毎】	(DLBCL) day1RIT375mg/m ² ,day2# 51.8mg/kg,day2,3 # 90mg/m ² 【4週毎】※最大6回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル-コ-テフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/m ² Day1 大塚生食注(規格なし):337.5ml/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注パツグ1mg/50mL:1本 Day2 Day3 デキサ-ト注射液3.3mg/mL/A:3A Day2 Day3 ボライビ-点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day2 注射用水フソ-20mL :1A Day2 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 # 90mg/m ² 塩酸塩点滴静注液100mg/4mL:90mg/m ² Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
38	blo099	血液-内;NHL_リンパ球増殖抑制剤療法【3週毎】	リンパ球増殖抑制剤 (リンパ) 9μg/kg 最大8回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサ-ト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 レミトド点滴静注用300μg:9μg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水フソ-20mL :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	-
39	blo100	血液-内;#1【1回-1回】scDCyBD療法【4週毎】	sc# 1800mg/body day1,8,15,22 CPA(内服)300mg/m ² day1,8,15,22 # 1.3mg/m ² day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	ダラキ-配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22 ホルテゾミブ注射用3mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
40	blo101	血液-内;#2【2回-1回】scDCyBD療法【4週毎】	sc# 1800mg/body day1,8,15,22 CPA(内服)300mg/m ² day1,8,15,22 # 1.3mg/m ² day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	ダラキ-配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22 ホルテゾミブ注射用3mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
41	blo102	血液-内;#3【3回-1回】scDCyBD療法【4週毎】	sc# 1800mg/body day1,15, CPA(内服)300mg/m ² day1,8,15,22 # 1.3mg/m ² day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	ダラキ-配合皮下注:1V Day1 Day15 ホルテゾミブ注射用3mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
42	blo103	血液-内;#4【4回-1回以降】scDCyBD療法【4週毎】	sc# 1800mg/body day1, DEX(内服)20mg day1	ダラキ-配合皮下注:1V Day1	-
43	blo105	血液-内;MM_【1回-1回以降】IsaKd療法【4週毎】	伊沙多# 10mg/kg day1,15, 加# 56mg/m ² day1,2,8,9,15,16, # 40mg/week	生食注250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 デキサ-ト注射液3.3mg/mL/A:6A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生食注100mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 サ-グ#点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイロリス点滴静注用(規格なし):56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
44	blo106	血液-内NHL_FCM療法【4週毎】	※最大4回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注パツグ1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 フルダラ静注用50mg :25mg/m ² Day1 Day2 Day3 注射用水フソ-20mL :1A Day1 Day2 Day3 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 インドキサン注(規格なし):200mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食注 50mL/袋(点滴用) :1本 Day1 Day2 Day3 ノコト注 20mg/10mL/V:8mg/m ² Day2 生食注 100mL (針なし) :1本 Day2	中等度
45	blo107	血液-内;AML_VEN+LDAC療法【4週毎】	【28日間】※PDまで # 400mg連日投与	キロサイド注(規格なし):20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10	最小度

46	blo108	血液-内;NHL_polaR-THP-CP療法【3週毎】	※polaR-THP-CP療法は6J-7まで※7, 8J-7はRITのみ PSLday3-7	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day3 ソル・コーテブ注射用100mg/V(溶解液付):1V Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/m Day1 大塚生食注(規格なし):337.5ml/m Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day3 ポリビー点滴静注(規格なし):1.8mg/kg Day3 注射用水フソ-20mL:1A Day3 生食注 100mL(針なし):1本 Day3 ビルビン注射用(規格なし):50mg/m Day3 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day3 エンドキサン注(規格なし):750mg/m Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day3	高度
47	blo109	血液-内;PTCL_7°ラトリ物ト療法【7週毎】	アラトリ物トday1,8,15,22,29,36 ※PDまで ★R°ラ°物ト、M°ラ°ラ°注、射ト錠 確認	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ジフォルタ注射液20mg/V:30mg/m Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	軽度
48	blo110	血液-内;MM_Bd療法【3週毎】	BOR1.3mg/m/day1,4,8,11,DEX20mg/day day1,2,4,5,8,9,11,12 ※PDま で	ボルテゾミブ注射用3mg:1.3mg/m Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11	-
49	blo111	血液-内;PTCL_9°ラ°ラ°療法【3週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ガルビラス点滴静注用135mg:300mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水フソ-20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	最小度
50	blo113	血液-内;CLL_【3-7J-8目】加カス+カ°ガ°イ°療法	【4週毎】※6J-7 加カス28日間(1J-8目) 加カス+カ°ガ°イ°(2-7J-8目) 加カス(8J-8目~)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ガザイバ点滴静注 1000mg:1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1	最小度
51	blo114	血液-内;MM_【1J-8目】Isad療法【4週毎】	イ°ラ°ラ° 20mg/kg day1,8,15,22,DEX40mg day1,8,15,22,	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサト注射液3.3mg/mL/A:12A Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注(規格なし):20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	-
52	blo115	血液-内;MM_【2J-8目以降】Isad療法【4週毎】	イ°ラ°ラ° 20mg/kg day1,15,DE40mg day1,8,15,22,	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサト注射液3.3mg/mL/A:12A Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 Day22 サークリサ点滴静注(規格なし):20mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	-
53	blo117	血液-内;NHL_【2-3コース目】I°ラ°ラ°療法【4週毎】	I°ラ°ラ° : 48mg/body day1,8,15,22	エプキン皮下注48mg:1V day1,8,15,22	-
54	blo118	血液-内;NHL_【4-9コース目】I°ラ°ラ°療法【4週毎】	I°ラ°ラ° : 48mg/body day1,15	エプキン皮下注48mg:1V day1,15	-
55	blo119	血液-内;NHL_【10コース目以降】I°ラ°ラ°療法【4週毎】	I°ラ°ラ° : 48mg/body day1	エプキン皮下注48mg:1V day1	-

56	blo120	血液-内;PTCL/CTCL_7"レツサマ"ハト"ヲ療法【3週毎】	※最大16サイクルまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 500mL (針なし):1本 Day1 アドセトリス点滴静注液50mg/V:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水 100mL/本:1本 Day1 生食注 100mL/本:1本 Day1	軽度
57	blo125	血液-内;MM【3-24週目】エルナタマブ療法【1週毎】	エルレフィオ:76mg/body day1	エルレフィオ皮下注76mg:1V day1	-
58	blo126	血液-内;MM【25週以降】エルナタマブ療法【2週毎】	エルレフィオ:76mg/body day1	エルレフィオ皮下注76mg:1V day1	-
59	blo128	血液-内;FL【2-5]-R2療法【4週毎】	伊勢サマ 375mg/m ² ;day1 レキドミ 20mg;day1~21 ※6-12サイクルは"レキドミ"のみ ※"レキドミ"後発不可	生食注 250mL/袋:1本 Day1 ソル・コナテフ注射用100mg/V:1V Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 リツキシマブBS点滴静注 (規格なし):375mg/m ² Day1 大塚生食注 (規格なし):337.5mL/m ² Day1	-
60	blo133	血液-内;MM_【2-4]-R1目】IsaVRd療法【6週毎】	伊勢サマ 10mg/kg day1,15,29,7"サマ"20mg/day day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33 #レキドミ 1.3mg/m ² day1,4,8,11,22,25,29,32 レキドミ 25mg,day1~14,22~35	生食注 250mL/袋:1本 Day1 Day15 Day29 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 Day15 Day29 生食注 1000mL (針なし):1本 Day1 Day15 Day29 ポリデキサト注射液 (規格なし):1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生食注 200mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 サークル点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 Day29 生食注 250mL/袋:1本 Day1 Day15 Day29	軽度
61	blo134	血液-内;MM_【5-17]-R1目】IsaVRd療法【4週毎】	伊勢サマ 10mg/kg day1,15,7"サマ"20mg/day day1,8,15,22 レキドミ 25mg,day1~21	生食注 250mL/袋:1本 Day1 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 Day15 生食注 1000mL (針なし):1本 Day1 Day15 サークル点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1本 Day1 Day15	軽度
62	blo135	血液-内;MM_【18]-以降】IsaVRd療法【4週毎】	伊勢サマ 10mg/kg day1,7"サマ"20mg/day day1,8,15,22 レキドミ 25mg,day1~21	生食注 250mL/袋:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 生食注 1000mL (針なし):1本 Day1 サークル点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1本 Day1	軽度
63	blo137	血液-内;FL_【2サイクル目】モスネズマブ療法【3週毎】	day1 伊勢サマ 60mg	生食注 250mL/袋:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 生食注 500mL (針なし):1本 Day1 生食注 1000mL (針なし):1本 Day1 ルンズミオ点滴静注 30mg:60mg Day1 生食注 250mL/袋:1本 Day1	-
64	blo138	血液-内;FL_【3サイクル目以降】モスネズマブ療法【3週毎】	day1 伊勢サマ 30mg※8サイクル終了時に①CR→投与終了②PR/SD→最大17サイクル	生食注 250mL/袋:1本 Day1 ルンズミオ点滴静注 30mg:30mg Day1 生食注 250mL/袋:1本 Day1	-
65	blo140	血液-内;MM_【2]-以降(継続投与期)]テクベリマブ療法【1週毎】	day1:テクベリ 1.5mg/kg day1	テクベリ皮下注 153mg:1.5mg/kg Day1	-
66	blo142	MM【2コース目以降(継続投与期)]トアルクエタマブ療法【2週毎】	day1:タービー 0.8mg/kg	タービー皮下注 40mg/1mL:0.8mg/kg Day1	-

67	blo144	内科. MM[2-12コース目]IsaVR d療法 (BENEFIT)[4週毎]	伊勢特効 [®] 10mg/kg day1,15 特効 [®] 20mg/day day1,8,15,22 特効 [®] 1.3mg/m day1,8,15 特効 [®] 25mg day1~21	生食注250m L /袋:1袋 Day1 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 Day15 生食注100m L (針なし) :1本 Day1 Day15 ボルテゾミブ注:1.3mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 20m L / A :1A Day1 Day8 Day15 サークル点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 Day8 生食注 250m L /袋:1袋 Day1 Day8	-
68	blo145	内科. MM[13-18コース目]IsaVR d療法 (BENEFIT)[4週毎]	伊勢特効 [®] 10mg/kg day1 特効 [®] 1.3mg/m day1,15 特効 [®] 25mg day1~21	生食注250m L /袋:1袋 Day1 ボルテゾミブ注:1.3mg/m Day1 Day15 生食注 20m L / A :1A Day1 Day15 サークル点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250m L /袋:1袋 Day1	-
69	blo146	内科. MM[19コース以降]IsaVR d療法 (BENEFIT)[4週毎]	伊勢特効 [®] 10mg/kg day1 特効 [®] 25mg day1~21	生食注250m L /袋:1袋 Day1 サークル点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250m L /袋:1袋 Day1	-