

【食道がん(外来)】

最終更新令和6年12月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性リスク
1 eso003	食道-外;Low doseFP療法	5日連続2日休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン注 10mg/20mL/V(後発品):10mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 250mg/5mL/V(後発):500mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	高度
2 eso005	食道-外;weekly PTX100mg/m ² [6投1休]	weekly PTX 100mg/m ² day1,8,15,22,29,36【49日で1コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注 20mg(希釈液不要):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル静注(規格なし):100mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	中等度に準ずる
3 eso006	食道-外;ニルルマ [®] 療法【2週毎】	【進行・再発(2次治療以降に導入、PDまで)】[adjuvant(最長1年間)]	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
4 eso008	食道-外;FOLFOX療法【2週毎】	※CDDP不耐例に対し本治療を考慮、最新のガイドラインを確認!!	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 i [®] 注射点滴静注用(規格なし):200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
5 eso012	食道-内;ニルルマ [®] 480療法【4週毎】	【進行・再発(2次治療以降に導入、PDまで)】[adjuvant(最長1年間)]	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):480mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
6 eso014	食道-外;ニルルマ [®] +化 [®] 療法【6週毎】	day1,22ニルルマ [®] 360mg/body,day1化 [®] 1mg/kg ※PDまで、ニルルマ [®] 、化 [®] は最長2年間まで投与可	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):360mg Day1,22 生食注 100mL(針なし):1本 Day1,22 ヤーボイ注(規格なし):1mg/kg Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1	最小度
7 eso015	食道-内;ニルルマ [®] 療法【3週毎】	ニルルマ [®] 200mg/body ※PD-L1発現陽性について確認すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ注100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度