

【婦人科がん(外来)】

最終更新令和6年12月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 gyn001	婦;TC療法【4週毎】	CBDC(AUC:5),PTX 175mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 加味*アチワン点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
2 gyn002	婦;子宮頸癌_TC+Bmab療法【2-6J-入】【4週毎】	CBDC(AUC:5),PTX 175mg/mi,Bmab 15mg/kg[最大6J-入目まで]	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 加味*アチワン点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
3 gyn003	婦;子宮頸癌_Bmab単剤療法【7-22J-入】【4週毎】	Bmab 15mg/kg[最大22J-入目まで]	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
4 gyn004	婦;卵巣癌_DC療法【1J-入】【4週毎】	CBDC(AUC:5),DTX 70mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ドセタキセル点滴静注液(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 加味*アチワン点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
5 gyn005	婦;卵巣癌_DC+Bmab療法【2-6J-入】【4週毎】	CBDC(AUC:5),DTX 70mg/mi,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ドセタキセル点滴静注液(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 加味*アチワン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
6 gyn007	婦;卵巣癌_ddTC療法【4週毎】	CBDC(AUC:5) day1,PTX 80mg/mi day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フモチジン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加味*アチワン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
7 gyn008	婦;卵巣癌_ddTC+Bmab療法【4週毎】	CBDC(AUC:5) day1,PTX 80mg/mi day1,8,15,Bmab 15mg/kg day1	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フモチジン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加味*アチワン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
8 gyn010	婦;卵巣癌_PLD+CBDC+Bmab療法【4週毎】	PLD(ドセタキセル) 30mg/mi,CBDC(AUC:5),Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ドキシル注 20mg/100mL:30mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 加味*アチワン点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ペバシズマブBS点滴静注(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)

9	gyn012	婦;PLD単剤療法【4週毎】	PLD(トシホ) 40mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ドキシル注 20mg/10mL:40mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
10	gyn013	婦;PLD+Bmab療法【3週毎】	PLD(トシホ) 30mg/m ² ,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 ドキシル注 20mg/10mL:30mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 ペバシズマブBS点滴静注 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	軽度
11	gyn014	婦;GEM単独療法【3投1休】【4週毎】	GEM 1000mg/m ² day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15	軽度
12	gyn015	婦;卵巣癌_GEM+Bmab療法【3週毎】	Bmab 15mg/kg,GEM 1000mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 ペバシズマブBS点滴静注 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 ゲムシタピン点滴静注用 (規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8	軽度
13	gyn023	婦;子宮肉腫-婦;(short) AP (ADM+CDDP)療法【3週毎】	ADM 60mg/m ² CDDP 50mg/m ² 目安;6コース 65歳 ≧ADM60mg/m ² 、65歳<ADM45mg/m ²	生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 H ₂ O/トシホ点滴静注/バッグ 0.75mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ドキシル注 20mg/10mL:60mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 スプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 フロセミド注 20mg/2mL/A:1A Day1 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day1 KN3号輸液 500mL:1袋 Day1	高度
14	gyn025	婦;子宮体癌_パドメタキシル+レバチン療法【3週毎】	パドメタキシル 200mg/body day1,レバチン 1回20mg1 日1回連日 ※PDまで **パドメタキシルは最大35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
15	gyn026	婦;子宮頸癌_パドメタキシル+TC+Bmab療法【3週毎】	※最大6コース→維持療法(パドメタキシル+Bmab) (パドメタキシルは計35回まで)	生食注 250mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 グラニセトン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 テモチン静注 20mg(希釈液不要):1A Day1 パクリタキセル静注 (規格なし) :175mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト) :1本 Day1 加糖アミノ点滴静注液 (規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アバシチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1	中等度 (特定)
16	gyn027	婦;子宮頸癌_パドメタキシル+Bmab療法【3週毎】	【維持療法】パドメタキシル+TC+Bmab療法 最大6コース後に実施。(パドメタキシルは導入療法と合わせて計35回)	生食注 250mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 アバシチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度

17	gyn028	婦;子宮頸癌-セミプリマブ療法【3週毎】	セミプリマブ 350mg/body ※PDまで	生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1 リプト点滴静注用350mg/7mL:350mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
18	gyn29	婦-子宮体癌;テ111 ^β IR ^β +TC+お ^β IR ^β 療法【1-6J-入】【3週毎】	・新たに診断された進行または再発子宮体癌 ・再発の場合は手術による治癒の可能性は低く、術後補助化学療法最終投与から1年以上経過している場合	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注 20mg:1A Day1 イミンジ点滴静注用:1120mg/m ² Day1 生食注 250mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加 ^β ア ^β チ ^β 点滴静注液:AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
19	gyn30	婦-子宮体癌;テ111 ^β IR ^β +TC+お ^β IR ^β 療法【7J-入】【維持療法】【4週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミンジ点滴静注用:1500mg/m ² Day1 生食注 250mL(針なし):1本 Day1	最小度
20	gyn32	婦-子宮体癌;テ111 ^β IR ^β +TC療法【3週毎】	化学療法歴がない進行・再発の子宮体癌※最大6コース	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注 20mg:1A Day1 キイトルーダ点滴静注用:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル注:175mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加 ^β ア ^β チ ^β 点滴静注液:AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
21	gyn33	婦-子宮体癌;テ111 ^β IR ^β 400療法【6週毎】	※最大14コース	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注用:400mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
22	gyn034	婦;卵巣癌_TC+Bmab療法【2-6J-入】【4週毎】	CBDC(AUC:5),PTX 175mg/m ² ,Bmab 15mg/kg【最大6J-入目まで】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注 20mg:1A Day1 パクリタキセル静注:175mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 500mL:1本 Day1 加 ^β ア ^β チ ^β 点滴静注液:AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL:1本 Day1 ペバシズマブ点滴静注用:15mg/kg Day1 生食注 100mL:1本 Day1	中等度 (特定)
23	gyn035	婦;卵巣癌_Bmab単剤療法【7-22J-入】【4週毎】	Bmab 15mg/kg【最大22J-入目まで】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペバシズマブ点滴静注用:15mg/kg Day1 生食注 100mL:1本 Day1	最小度
24	gyn36	婦-子宮頸癌_リツマ ^β ア ^β ドチ ^β (テ ^β ダ ^β カ)療法【3週毎】	リツマ ^β ア ^β ドチ ^β :day1 2mg/kg(最大200mg/body) ※眼科受診必須!	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 テ ^β ダ ^β カ点滴静注用 40mg:2mg/kg Day1 注射用水フソ-20mL:1A Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1	軽度