

【乳がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 bre002	乳-外;【固定量】PTX療法【毎週】	PTX;100mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):100mg Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる
2 bre003	乳-外;DTX(70mg/m)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ドキシタキセル点滴静注(規格なし):70mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3 bre004	乳-外;PTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/m Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度に 準ずる
4 bre005	乳-外;FEC療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パクリタキセル点滴静注バッグ 0.75mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 エリビリン塩酸塩注射液(規格なし):100mg/m Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):500mg/m Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):500mg/m Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	高度
5 bre007	乳-外;【初回以降】PTX+Tmab(4mg/kg)療法【毎週】	PTX (day1); 80mg/m、Tmab (day1); 4mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
6 bre008	乳-外;【2回以降】PTX+Tmab(2mg/kg)療法【毎週】	PTX (day1): 80mg/m、Tmab (day1): 2mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):2mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
7 bre009	乳-外;PTX療法(3投1休)療法【4週毎】	day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/m Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に 準ずる
8 bre010	乳-外;nabPTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アラキサン点滴静注用 100mg(特生物):260mg/m Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度に 準ずる

9	bre011	乳-外;【初回-1】PTX(175)+Tmab(8)療法【3週毎】	PTX175mg/m ² +Tmab8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 ファモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/m² Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に準ずる
10	bre012	乳-外;【2回-以降】PTX(175)+Tmab(6)療法【3週毎】	PTX175mg/m ² +Tmab6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 ファモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/m² Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に準ずる
11	bre013	乳-外;AC療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 H²阻害剤点滴静注(針)0.75mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 トキソルピジン塩酸塩注(規格なし):60mg/m² Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/m² Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	高度
12	bre014	乳-外;Bmab(10mg/kg)+PTX(90mg/m ²)療法【4週毎】	Bmab10mg/kg (day1,15) +PTX90mg/m ² (day1,8,15)	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 アパシチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):90mg/m² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15</p>	軽度
13	bre015	乳-外;Iリノ療法(1投1休)【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 エリブリンメシル酸塩静注液 1mg:1.4mg/m² Day1 生食注 50mL(針なし):25ml Day1</p>	軽度
14	bre016	乳-外;Iリノ療法(2投1休)【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 エリブリンメシル酸塩静注液 1mg:1.4mg/m² Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):25ml Day1 Day8</p>	軽度
15	bre017	乳-外;【初回-1】Tmab療法【3週毎】	Tmab 8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
16	bre018	乳-外;【2回-以降】Tmab療法【3週毎】	Tmab 6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
17	bre019	乳-外;【初回-1】H ² 阻害剤 + Tmab+DTX療法【3週毎】	H ² 阻害剤840mg/body、Tmab8mg/kg、ドキシタキセル60mg/m ² ※H ² 阻害剤前投与より6週以上の間隔を確認	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 パーシタ点滴静注 420mg/14mL:840mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用「NKJ」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ドキシタキセル点滴静注液(規格なし):60mg/m² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1</p>	軽度

26	bre028	乳-外;【初コ-ス以降】Iリマリン+Tmab療法【3週毎】	ルマブイ(day1,8) : 1.4mg/m ² , Tmab (day1) : 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 エリブリン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m ² Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):25ml Day1 Day8 トラスツマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
27	bre029	乳-外;【2コ-ス以降】Iリマリン+Tmab療法【3週毎】	ルマブイ(day1,8) : 1.4mg/m ² , Tmab (day1) : 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 エリブリン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m ² Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):25ml Day1 Day8 トラスツマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
28	bre030	乳-外;アテゾリズマブ+nabPTX療法【4週毎】	アテゾリズマブ:840mg/body (day1,15), nab-PTX:100mg/m ² (day1,8,15)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アプタキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注840mg:840mg Day1 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
29	bre031	乳-外;A ^o Δ ^o リマリン + GEM+CBDC療法【3週毎】	※PDまで(A ^o Δ ^o リマリンは計35回まで)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 加林ア ^o ラチ点滴静注液(規格なし):AUC=2 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト):1本 Day8	中等度に準ずる
30	bre032	乳-外;トラスツマブ デ ^o ルシカ(エリブリン)療法【3週毎】	トラスツマブ デ ^o ルシカ5.4mg/kg	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 バロノセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
31	bre033	乳-外;A ^o Δ ^o リマリン + PTX療法【12週ごと】	A ^o Δ ^o リマリン day1,22,43,64 PTXday1,8,15,29,36,43,57,64,71 ※PDまで(A ^o Δ ^o リマリンは計35回まで)	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 Day22 Day43 Day64 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day22 Day43 Day64 パクリタキセル静注(規格なし):90mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71	中等度に準ずる
32	bre034	乳-外-入;CBDC+PTX療法【4週毎】	【adjuvant】※6コ-スまで、CBDC(AUC=2)	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 加林ア ^o ラチ点滴静注液(規格なし):AUC=2 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
33	bre035	乳-外;【術前①】A ^o Δ ^o リマリン + CBDC+PTX療法	【neoadjuvant】※3週毎※4コ-ス →【術前②】A ^o Δ ^o リマリン + AC/EC療法へ	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):3本 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 フモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:2袋 Day1 Day8 Day15 加林ア ^o ラチ点滴静注液(規格なし):AUC=2 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
34	bre036a	乳-外;【術前②】A ^o Δ ^o リマリン + AC療法【3週毎】	【neoadjuvant】※4コ-ス→【術後③】A ^o Δ ^o リマリン療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 バ ^o ノセトロン点滴静注A ^o 0.75mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 トキソリン塩酸塩注(規格なし):60mg/m ² Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1	高度

