

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性リスク
1 uro001	泌;DTX(70mg/m ²)+PSL療法【3週毎】	DTX 70mg/m ² ,PSL 10mg/day連日内服	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トモチビ点滴静注液(規格なし):70mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度に準じる
2 uro002	泌;尿路上皮癌_GEM単独療法【3投1休】【4週毎】	GEM 1000mg/m ² day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
3 uro009	泌;前立腺癌_CBZ+PSL療法【3週毎】	CBZ 25mg/m ² ,PSL 10mg/day連日内服	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:2A Day1 フモチシン静注20mg(希釈液不要):1A Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 ジェブタナ点滴静注60mg:25mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
4 uro011	泌;腎癌_ニキルマ療法【2週毎】	ニキルマ 240mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
5 uro012	泌;尿路上皮癌_GEM+CBDC療法【3週毎】	CBDC(AUC:5) day1,GEM 1000mg/m ² day1,8	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注/ツグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 加麻アチカ点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
6 uro013	泌;尿路上皮癌_ハムリマ療法【3週毎】	ハムリマ 200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
7 uro014	泌;腎癌_ニキルマ+化リマ療法【3週毎】	ニキルマ 240mg/body,化リマ 1mg/kg 併用投与期間は3週毎4サイクル、その後ニキルマ単独へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ヤーボイ点滴静注 50mg/10mL/V:1mg/kg Day1 生食注 50mL(針なし):30ml Day1	最小度
8 uro016	泌;腎癌_ハムリマ+アチカ療法【3週毎】	ハムリマ 200mg/body day1,アチカ 1回5mg1日2回連日 **ハムリマは最大35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度

9	uro017	泌;精巣腫瘍_CPT-11+NDP療法【4週毎】	CPT-11 200-300mg/m ² +NDP 100mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 リリカ塩酸塩点滴静注液(規格なし):300mg/m ² Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 アクブラ静注用 (規格なし) :100mg/m ² Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1 KN3号輸液 500mL:1袋 Day1	中等度 (特定)
10	uro018	泌;尿路上皮癌_アムルン療法【2週毎】	アムルン 10mg/kg ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パベンチオ点滴静注 200mg/10mL:10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
11	uro019	泌;尿路上皮癌_エリツマリン療法【4週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 パドセブ点滴静注用 30mg:1.25mg/kg Day1 Day8 Day15 注射用水フソ-20mL:1A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15	軽度
12	uro020	泌;腎癌_ニルルチン+カサザチン療法【2週毎】	ニルルチン 240mg/body day1,カサザチン 1回40mg1日1回連日 **ニルルチンは最長2年間まで	生食注 250mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 オブジーボ点滴静注 240mg/24mL/V:1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
13	uro021	泌;腎癌_アムルン+レニバチン療法【3週毎】	アムルン 200mg/body day1,レニバチン 1回20mg1日1回連日 ※PDまで **アムルンは最大35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
14	uro022	泌;腎癌_アムルン+アサチン療法【6週毎】	アムルン 400mg/body day1,アサチン 1回5mg1日2回連日 **アムルン投与は最大約2年	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:400mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
15	uro023	泌;尿路上皮癌_ニルルチン療法【2週毎】	※adjuvant (最長1年間まで) ニルルチン 240mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
16	uro024	泌;前立腺癌_DTX (75mg/m ²)+ARSI+ADT療法【3週毎】	DTX 75mg/m ² ,PSL 10mg/day連日内服は、患者状態により判断。 ※最大6コース	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 ドセタキセル点滴静注用 (規格なし):75mg/m ² Day1 生食注250mL:1袋 Day1	軽度
17	uro025	泌;尿路上皮癌_エリツマリン+アムルン療法【3週毎】	エリツマリン 1.25mg/kg day1,8 アムルン 200mg/body day1 ※最大35コース	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 パドセブ点滴静注:1.25mg/kg Day1 Day8 注射用水フソ-20mL:1A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	軽度

18	uro026	泌尿器癌_【術後】VEGF阻害薬療法【3週毎】	VEGF阻害薬 200mg/body ※投与期間は12ヶ月間まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
----	--------	--------------------------------	-------------------------------------	--	-----