

【肝臓がん・胆道がん・膵臓癌(外来)】

最終更新令和6年12月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 liv001	肝胆膵-内;胆道癌CDDP+GEM療法【3週毎】	シスプラチン25mg/m <sup>2</sup> +ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 21日で13-3	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 シスプラチン注(規格なし)(後発品):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8	中等度(特定)に準ずる
2 liv002	肝胆膵-内;膵癌nabPTX+GEM療法【4週毎】	nab-PTX 125mg/m <sup>2</sup> +ゲムシタビン1000mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アプライン点滴静注用 100mg(特生物):125mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
3 liv003	肝胆膵-外;GEM+S-1療法【1投1休】(2週毎)	GEM(1投1休)、S-1(day1~7内服、day8~14休業)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	軽度
4 liv004	肝胆膵-外;胆道癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
5 liv005	肝胆膵-外;膵癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
6 liv006	肝胆膵-外;膵癌FOLFIRINOX療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 FOLFIRINOX点滴静注/バッグ0.75mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキザリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Irinotecan点滴静注用(規格なし):200mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Irinotecan点滴静注液(規格なし):180mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Irinotecan点滴静注用(規格なし):200mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	高度
7 liv009	肝胆膵-外;膵癌RAM療法【2週毎】	サラムゲン8mg/kg ★AFP400ng/mL以上であること、Child-Pugh分類Aであること確認★	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 サラムゲン点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
8 liv010	肝胆膵-外;膵癌GS療法【3週毎】	GEM(day1,8),S-1(2投1休)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8	軽度

9	liv011	肝胆腫-外; 肝癌内臓切除+FF療法【2週毎】	二次治療以降の使用であること。	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 オニバン点滴静注43mg:70mg/mi Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 キトルーダ点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度 (特定)
10	liv012	肝-外; アテゾリチン+ Bmab療法【3週毎】	【切除不能な肝細胞癌】 (day1)アテ:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバスタチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
11	liv013	肝胆腫-内; 肝癌_modifiedFOLFIRINOX療法【2週毎】	PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 FOLFIRINOX点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 キトルーダ点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 リリチン塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	高度
12	liv015	肝胆腫-外; 胆道癌^1117+GC療法【3週毎】	※8コース投与後→アテゾリチン1500療法へ	生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用 (規格なし):1000mg/mi Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/mi Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	高度
13	liv016	胆管腫-外; アテゾリチン1500療法【4週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
14	liv017	肝胆腫-外; トレキニチン+アテゾリチン療法【1回-1日】	肝癌、トレキニチン+アテゾリチン療法1コース投与 →アテゾリチン1500療法【4週毎】へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イジド点滴静注 300mg/15mL:300mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
15	liv018	肝胆腫-外; 胆道癌^1117+GC療法【3週毎】	※8コース投与後→アテゾリチン+GEM療法へ	生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1,8 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1,8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1,8 キトルーダ点滴静注用100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/mi Day1,8 生食注 250mL/袋 (点滴用) :1本 Day1,8 ゲムシタピン点滴静注用 (規格なし):1000mg/mi Day1,8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1,8 生食注 500mL/袋:1袋 Day1,8	高度
16	liv019	肝胆腫-外; 胆道癌^1117+GEM療法【3週毎】	※Pembro : 最大35コースまで、GEM : PDまで ※Pembro+GC療法@コース後	生食注 250mL/袋 (点滴用) :1本 Day1,8 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1,8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1,8 キトルーダ点滴静注用100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 ゲムシタピン点滴静注用 (規格なし):1000mg/mi Day1,8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1,8	軽度
17	liv020	肝細胞癌_ニボルマブ+イピリムマブ療法【3週毎】	※最大4サイクル→オプジーボ単独投与へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ点滴静注:80mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 ヤーボイ注(規格なし):3mg/kg Day1 生食注 100mL :1本 Day1	最小度
18	liv021	肝細胞癌_ニボルマブ480療法【4週毎】	day1:ニボルマブ480mg/body※PDまで、最長2年間まで投与可	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ点滴静注:480mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度